

Mir wurde ZEPOSIA verschrieben.

Wichtige Kontaktinformation

Der Arzt / Die Ärztin, der / die mir ZEPOSIA verschrieben hat:

Name: _____

Telefon: _____

Adresse: _____



Zeposia® (Ozanimod) Schwangerschaftsspezifische Patientenerinnerungskarte

(für gebärfähige Frauen)

Information für Patientinnen

Bei Anwendung während der Schwangerschaft kann ZEPOSIA® (Ozanimod) dem ungeborenen Kind schaden. Mögliche Risiken schließen den Verlust des ungeborenen Babys und Fehlbildungen ein.

- Sie dürfen ZEPOSIA nicht einnehmen, wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie eine gebärfähige Frau sind und keine zuverlässige Empfängnisverhütung anwenden.
- Bevor Sie die Behandlung mit ZEPOSIA beginnen:
 1. Ihr verschreibender Arzt / Ihre verschreibende Ärztin wird Ihnen die möglichen Risiken für ein ungeborenes Baby erklären, wenn Sie während der Einnahme von ZEPOSIA schwanger werden, und Sie regelmäßig informieren, wie Sie die Risiken verringern können.
 2. Sie müssen eine zuverlässige Empfängnisverhütung während der Behandlung mit ZEPOSIA und für 3 Monate nach Absetzen von ZEPOSIA anwenden.
 3. Sie müssen einen negativen Schwangerschaftstest vorweisen, der von Ihrem / Ihrer verschreibenden Arzt / Ärztin überprüft wird und in angemessenen Abständen wiederholt werden muss.
- Sollten Sie während der Behandlung schwanger werden, muss ZEPOSIA abgesetzt werden. Ihr Arzt / Ihre Ärztin wird Sie über die schädlichen Wirkungen auf das Baby in Verbindung mit der ZEPOSIA-Behandlung informieren. Ultraschalluntersuchungen sollten durchgeführt werden.
- Sie sollten ZEPOSIA 3 Monate bevor Sie eine Schwangerschaft planen absetzen.
- Wenn Sie ZEPOSIA absetzen, informieren Sie sofort Ihren Arzt / Ihre Ärztin, wenn sich die Symptome Ihrer Erkrankung verschlechtern. Es besteht die Möglichkeit, dass die Krankheit wieder aktiv wird.
- Informieren Sie sofort Ihren Arzt / Ihre Ärztin, wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder planen, schwanger zu werden.

Die Kontaktdaten Ihres / Ihrer verschreibenden Arztes / Ärztin befinden sich auf der Rückseite dieser Patientenerinnerungskarte.

Für weitere Informationen zu Wirkungen und Nebenwirkungen von ZEPOSIA, lesen Sie bitte die Gebrauchsinformation (Packungsbeilage) von ZEPOSIA.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihre/n Arzt / Ärztin oder Apotheker/in.

Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG), Traisengasse 5, 1200 Wien (Fax: +43 50 555-36207, Website: nebenwirkung.basg.gv.at) melden. Weitere Informationen zur Meldung von Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation (Packungsbeilage).

Für weitere Informationen oder wenn Sie weitere Exemplare dieses Dokuments benötigen, wenden Sie sich bitte an:

Bristol Myers Squibb Österreich
Abteilung Medical Information
Tel.: +43 1 601 43 220
E-Mail: medinfo.austria@bms.com