

Patientkort

- Du skal altid have patientkortet på dig og vise det til al sundhedspersonale, du behandles af (f.eks. hvis du ser en anden læge end du plejer, eller hvis du er ude at rejse)
- Patientkortet husker dig på vigtige symptomer, der straks skal rapporteres til lægen/ sygeplejersken. Det indeholder også kontaktoplysninger på din behandlende læge og vil gøre andet sundhedspersonale opmærksom på, at du bliver behandlet med YERVOY®
- Den sundhedsperson, der behandler dig med YERVOY®, skal udfylde afsnittet 'Min lægers kontaktoplysninger' på dette Patientkort og også udfylde lægens kontaktoplysninger nedenfor



Min læges kontaktoplysninger (lægen som udskrev YERVOY®)

Lægens navn:

Telefonnummer, åbningstid:

Telefonnummer udenfor åbningstid:



For yderligere oplysninger, se venligst indlægssedlen for YERVOY® på www.indlaegssedel.dk eller ring til Bristol Myers Squibb, Medicinsk Information på telf. 45280128 eller e-mail medinfo.denmark@bms.com

YERVOY® (ipilimumab)

Patientfolder

Hvis du har fået ordineret YERVOY® alene
→ Se denne vejledning og YERVOY® (ipilimumab) Patientkort.

Hvis du har fået ordineret YERVOY® i kombination med OPDIVO®
→ Se i stedet OPDIVO® (nivolumab) Patientkort.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejerske. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Indledning

- Denne Patientfolder giver dig information om behandling med YERVOY® og beskriver potentielle tegn og symptomer på bivirkninger, du eventuelt kan få
- Den giver også vigtige råd om, hvad du skal gøre, hvis du oplever tegn og symptomer, for at sikre dig, at disse tegn og symptomer ikke forværres, og at du behandles så hurtigt og effektivt som muligt
- YERVOY® kan forårsage alvorlige bivirkninger i forskellige dele af kroppen, der skal behandles omgående, uanset hvor alvorlige de er, for at undgå, at de forværres
- **Denne vejledning indeholder et Patientkort.** Husk altid at have Patientkortet på dig og vise det til al sundhedspersonale, som du behandles af (f.eks. hvis du ser en anden læge end du plejer, eller hvis du er ude at rejse)
- Yderligere oplysninger om YERVOY® findes i indlægssedlen

Hvad skal du tjekke med din læge før behandling



Inden behandlingen påbegyndes, skal du informere din læge om alle tidligere behandlinger, du har fået, og om alle sygdomme, du har haft eller har.

Derudover vil din læge tjekke følgende inden behandlingen:

- om du tager kortikosteroider eller andre behandlinger, der påvirker immunsystemet
- om du tager medicin, der forhindrer blodet i at størkne (antikoagulanter)
- leverfunktionstest (LFT)
- skjoldbruskkirtelfunktionstest
- om du har en autoimmun sygdom (en tilstand, hvor kroppen angriber sine egne celler)
- om du har eller nogensinde har haft en kronisk virusinfektion i leveren, herunder:
 - o hepatitis B (HBV)
 - o hepatitis C (HCV)
- om du har en human immundefekt virus (HIV)-infektion eller erhvervet immundefekt syndrom (AIDS)
- om du er gravid, ammer eller planlægger at blive gravid
- din almene fysiske tilstand for at afgøre, om du er egnet til behandlingen

De vigtigste bivirkninger ved din behandling

YERVOY® hjælper med at aktivere dit immunsystem til at bekæmpe kræftceller. Der er en risiko for, at dit aktiverede immunsystem kan skade sunde celler i din krop, hvilket kan forårsage potentielt alvorlige eller endda livstruende bivirkninger. Tegn og symptomer på bivirkninger kan forekomme når som helst under behandlingen eller endog måneder efter, at din behandling er afsluttet.

Hvad skal du gøre, hvis du har mistanke om en bivirkning:

- Ring **straks** til din læge, hvis du oplever tegn eller symptomer, eller hvis de vedvarer eller bliver værre. Tegn og symptomer, der kan forekomme milde, kan hurtigt forværres, hvis de ikke behandles
- Behandl **IKKE** tegn og symptomer selv
- Føl dig **IKKE** flov over eller bekymret for, at du forstyrrer din læge

Bemærk venligst:

- Følgende tegn og symptomer er **IKKE** alle de mulige tegn og symptomer på bivirkninger af behandling med YERVOY®
- Nogle tegn og/eller symptomer, der forekommer i en del af din krop, kan være relateret til en bivirkning i en anden del af din krop (for eksempel kan gul hud udgøre et leverproblem)

Tidlig behandling af bivirkninger mindsker sandsynligheden for at behandlingen skal udskydes eller stoppes permanent og på den måde får du størst fordel af behandlingen.

Mulige bivirkninger



MAVE OG TARM

- Diarré (vandig, løs eller blød afføring), blod i afføringen eller mørkfarvet afføring
- Flere afføringer end normalt
- Smerter eller ømhed i maveregionen, kvalme, opkastning



ØJNE

- Røde øjne
- Smerter i øjnene
- Synsforstyrrelser eller sløret syn



LEVER

- Gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot)
- Smerter i højre side af maveregionen
- Mørkfarvet urin



NERVER

- Muskelsvaghed
- Følelseløshed eller snurrende fornemmelse i ben, arme eller ansigt
- Svimmelhed, besvimelse eller problemer med at vågne



HUD

- Hududslæt med eller uden kløe, tør hud
- Blærer og/eller afskalning af huden, mundsår
- Hævelse af ansigt eller lymfekirtler



GENERELT

- Feber, hovedpine, træthed
- Blødninger
- Adfærdsændringer (f.eks. nedsat sexlyst, irriteret adfærd eller glemsomhed)
- Dehydrering, lavt blodtryk

Andre vigtige bivirkninger:

Alvorlige infusionsreaktioner

- Reaktionen på at injicere YERVOY® i blodbanen kan forekomme, normalt under eller inden for 24 timer efter indgivelse af en dosis
- **Fortæl det straks til din læge eller sygeplejerske, hvis du får disse symptomer under en infusion med YERVOY®: kulderystelser eller rystelser; kløe eller udslæt; rødmen; åndedrætsbesvær; svimmelhed; feber; og en følelse af at besvime**