



醫院地址：

辦公室電話：

姓名：

處方捷保舒給我的醫師：

重要聯絡資訊



捷保舒® (ZEPOSIA)



具生育能力女性病人須知



驗孕檢查



定期告知



避孕措施



病人須知



ZEPOSIA
once-daily | ozanimod

若在懷孕期間使用ZEPOSIA® (ozanimod)，可能會傷害胎兒，潛在風險包括失去胎兒及先天缺陷。

- 若您正在懷孕或在哺乳，或有懷孕的可能且沒有使用有效的避孕措施，請不要使用ZEPOSIA。
- 開始ZEPOSIA治療前：



您的處方醫師將向您確認是否正在懷孕或哺乳，必要時將進行驗孕檢查。



您的處方醫師將向您解釋若您在服用ZEPOSIA期間懷孕對胎兒的潛在風險，並且定期告知您該如何將風險降至最低。



您必須在服用ZEPOSIA期間及終止ZEPOSIA治療後3個月使用有效的避孕措施。

- 如您在治療期間懷孕，則需停用ZEPOSIA。您的醫師將會告知您與ZEPOSIA相關的對胎兒有害影響。
- 您須在計畫懷孕前3個月停止服用ZEPOSIA。
- 如果您停止服用ZEPOSIA，請立即告知醫師您的多發性硬化症是否惡化，因為這種疾病可能會復發。
- 若您正在懷孕或在哺乳，或認為您可能已經懷孕或計畫生育，請立刻告知您的醫師。

關於您的處方醫師聯絡資訊，請參閱此須知的背面。

關於更多ZEPOSIA的效果以及副作用的資訊，請參閱ZEPOSIA的藥品說明書。

若您欲瞭解更多資訊或須索取本文件的檔案，請查看台灣必治妥施貴寶股份有限公司的網站<https://www.bms.com/tw/product-information.html>或致電0800-666-132。