

CÂNCER DE BEXIGA EM NÚMEROS

CÂNCER DE BEXIGA É O **9º TIPO DE CÂNCER MAIS COMUM NO MUNDO** COM **430.000** NOVOS CASOS DIAGNOSTICADOS E CERCA DE **165.000** ÓBITOS EM 2012*.

O QUE É O CÂNCER DE BEXIGA?



O CÂNCER DE BEXIGA É UM TIPO DE CÂNCER QUE GERALMENTE COMEÇA NAS **CÉLULAS** QUE DELIMITAM O **INTERIOR DA BEXIGA**.

O **CARCINOMA UROTELIAL**, REPRESENTA APROXIMADAMENTE

90%

DOS CASOS DE CÂNCER DE BEXIGA

OUTROS TIPOS INCLUEM:

- CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS
- CARCINOMA DE PEQUENAS CÉLULAS
- ADENOCARCINOMA
- SARCOMA

MAIS COMUM EM HOMENS DO QUE EM MULHERES



MÉDIA DE IDADE

73

PARA DIAGNÓSTICO

79

PARA ÓBITO

A MAIORIA DOS CASOS DE CÂNCER DE BEXIGA SÃO DIAGNOSTICADOS NO ESTÁGIO INICIAL, MAS AS TAXAS DE RECIDIVA E PROGRESSÃO DA DOENÇA SÃO ALTAS.

ATÉ

78% DOS PACIENTES TERÃO RECIDIVA DA DOENÇA DENTRO DE **5 ANOS**.



CÂNCER DE BEXIGA POR REGIÃO

NÚMEROS ESTIMADOS DE NOVOS CASOS DE CÂNCER DE BEXIGA POR ANO (MILHARES)

AMÉRICA DO NORTE
76.7

EUROPA
151.3

ÁSIA
148.5

AMÉRICA CENTRAL
3.7

ÁFRICA
24.4


AMÉRICA DO SUL
18.7

AUSTRÁLIA & NOVA ZELÂNDIA
3.7

Fonte: GLOBOCAN 2012

TAXAS GLOBAIS DE SOBREVIVÊNCIA EM 5 ANOS*

AS TAXAS DE SOBREVIVÊNCIA GLOBAIS DEPENDEM DO ESTÁGIO E DO SUBTIPO DO CÂNCER DE BEXIGA



FATORES DE RISCO COMUNS PARA O CÂNCER DE BEXIGA



AMBIENTE DE TRABALHO



TABAGISMO



ETNIA BRANCA



IDADE AVANÇADA



SEXO MASCULINO



HISTÓRICO FAMILIAR



INFECÇÃO OU IRRITAÇÃO CRÔNICA NA BEXIGA

SINAIS E SINTOMAS



SANGUE NA URINA



DOR OU QUEIMAÇÃO AO URINAR



FLUXO DE URINA FRACO



URGÊNCIA EM URINAR, MESMO QUANDO A BEXIGA NÃO ESTEJA CHEIA



DOR LOMBAR



URINAR COM FREQUÊNCIA MAIOR QUE A HABITUAL

OPÇÕES DE TRATAMENTO

AS OPÇÕES DE TRATAMENTO PARA OS PACIENTES SÃO AMPLAS, E DEPENDENDO DO ESTÁGIO DA DOENÇA PODEM INCLUIR:



CIRURGIA



TERAPIA INTRAVENOSA OU INTRAVESICAL (quimioterapia e imunoterapia)



RADIOTERAPIA

A informação fornecida nesse material não se destina a substituir o aconselhamento médico oferecido pelo seu profissional de saúde. Se desejar ou precisar de tais serviços ou conselhos, consulte prontamente o seu médico.

*Fonte: American Cancer Society 2016

© 2018 Bristol-Myers Squibb