

OPDIVO^{MD}
(nivolumab)


OPDIVO + YERVOY^{MD}
(nivolumab) (ipilimumab)

Patients
Carte de renseignements
en cas d'urgence

Ce document a été élaboré par Bristol Myers Squibb dans le cadre du plan de réduction des risques pour OPDIVO. Ce document n'est pas destiné à un usage promotionnel.

Date d'approbation interne : septembre 2020

Numéro d'approbation local :
7356CA2000183

 Bristol Myers Squibb

Renseignements importants à l'intention des patients

Veuillez garder cette carte sur vous et la montrer à tout professionnel de la santé afin de l'informer que vous recevez un traitement par OPDIVO ou par OPDIVO en association avec YERVOY.



IMPORTANT

- Informez votre médecin de tout trouble médical antérieur, y compris si vous avez reçu une greffe de cellules souches provenant d'un donneur (allogénique)
- Il est crucial que votre médecin évalue et prenne en charge rapidement les effets secondaires.
- Des signes et symptômes qui semblent bénins peuvent s'aggraver rapidement s'ils ne sont pas traités.
- **N'essayez PAS** de traiter vous-même les symptômes.
- Les signes et symptômes peuvent se manifester des semaines ou des mois après votre dernière injection.

Pour de plus amples renseignements, consultez la monographie d'OPDIVO https://www.bms.com/assets/bms/ca/documents/productinformation_fr/OPDIVO_FR_PIL.pdf et le guide d'information à l'intention du patient ou communiquez avec le Service de l'information médicale au 1-866-463-6267.



EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Le traitement par OPDIVO pourrait augmenter le risque d'effets secondaires à médiation immunitaire graves ou même mortels, qui peuvent toucher différentes parties du corps. Voici certains signes et symptômes à surveiller :



GÉNÉRAUX :

- Modifications de l'humeur ou du comportement, (telles que baisse de libido, irritabilité, pertes de mémoire ou dépression),
- confusion et problèmes de mémoire,
- sensation de malaise général,
- fièvre,
- maux de tête,
- diminution ou augmentation de l'appétit,
- nausées ou vomissements,
- convulsions (crises convulsives),
- voir des choses qui ne sont pas vraiment là (hallucinations),
- enflure aux extrémités,
- enflure des ganglions lymphatiques,
- soif excessive,
- faim,
- sensation de paralysie,
- douleur du côté droit de l'estomac (abdomen),
- fatigue,
- perte ou gain de poids,
- picotements ou engourdissement (p. ex. des doigts ou des orteils),
- envie de dormir ou somnolence



Veuillez informer immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des symptômes ci-dessous ou tout autre symptôme.



MUSCLES ET OS :

- Difficulté à marcher,
- engourdissement des bras et/ou des jambes,
- douleurs musculaires ou articulaires,
- faiblesse ou raideur musculaire,
- raideur du cou



REINS ET VESSIE :

- Diminution ou augmentation de la quantité d'urine évacuée,
- urine plus foncée que d'habitude (couleur s'apparentant à celle du thé)



ESTOMAC ET INTESTIN :

- Selles noirâtres, goudronneuses ou collantes,
- présence de sang ou de mucus dans les selles,
- diarrhée (selles liquides ou molles) ou selles plus fréquentes que d'habitude,
- brûlures d'estomac ou indigestion,
- douleur ou sensibilité à l'estomac ou dans la région abdominale



YEUX :

- Changements de la vue (p. ex. vision floue, autres problèmes de vision),
- douleur ou rougeur aux yeux,
- jaunissement du blanc des yeux



POITRINE :

- Douleur à la poitrine,
- difficulté à respirer,
- toux,
- battements de cœur irréguliers,
- palpitations (être plus conscient de ses battements de cœur que d'habitude)



BOUCHE, NEZ ET GORGE :

- Ulcères/lésions dans la bouche ou autres muqueuses



PEAU :

- Tendance aux ecchymoses (bleus),
- peau sèche,
- démangeaisons,
- bosses à la surface de la peau (nodules cutanés),
- réaction ou éruption cutanée grave,
- cloques/desquamation de la peau,
- jaunissement de la peau (jaunisse)



Renseignements IMPORTANTES pour les professionnels de la santé

- Ce patient est traité par **OPDIVO** en monothérapie ou **en association avec YERVOY**.
- Des réactions indésirables à médiation immunitaire (RIMI) peuvent survenir à tout moment durant le traitement ou au cours des mois qui suivent son interruption.
- Un diagnostic rapide et une prise en charge appropriée sont essentiels pour réduire au minimum les risques de complications potentielles qui mettent la vie en danger.

- Il peut être utile de consulter un oncologue ou un autre médecin spécialiste afin d'aider à prendre en charge les RIMI propres à chaque organe.

Consultez la monographie d'OPDIVO à l'adresse https://www.bms.com/assets/bms/ca/documents/productmonograph_fr/OPDIVO_FR_PM.pdf

ou appelez le Service de l'information médicale de BMS au 1-866-463-6267 (sans frais).

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés avec l'utilisation d'un produit de santé en :

- visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (Déclarations des effets indésirables <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur la façon de faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur;

- Téléphonant sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Coordonnées de mon médecin (qui a prescrit OPDIVO seul ou en association avec YERVOY)

Nom du médecin:

N° de téléphone (bureau):

N° de téléphone après les heures
de bureau:

Mes coordonnées

Mon nom et mon numéro
de téléphone:

Personne à joindre en cas
d'urgence (nom et téléphone):



Le professionnel de la santé qui traite ce patient par OPDIVO

**seul ou en association avec
YERVOY doit remplir la section
« Coordonnées de mon
médecin » de la présente
carte de renseignements
en cas d'urgence.**

OPDIVO et YERVOY sont des marques
déposées de Bristol-Myers Squibb
Company utilisées sous licence par
La Société Bristol-Myers Squibb Canada.

©2020 Bristol-Myers Squibb Company.
Tous droits réservés.

OPDIVO et YERVOY sont des marques déposées
de Bristol-Myers Squibb Company utilisées sous licence
par La Société Bristol-Myers Squibb Canada.



MEMBRE DE
MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA

1422218