

MONOGRAPHIE DE PRODUIT  
INCLUANT LES RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT

<sup>Pr</sup>**ZEPOSIA<sup>MD</sup>**

Capsules d'ozanimod

0,23 mg, 0,46 mg et 0,92 mg d'ozanimod (sous forme de chlorhydrate d'ozanimod)

Modulateur du récepteur de la sphingosine 1-phosphate

Celgene Inc.  
6755 Mississauga Road  
Suite 600  
Mississauga, Ontario  
L5N 7Y2

Date d'approbation initiale :  
2 octobre 2020

© 2020 Celgene Corporation  
ZEPOSIA est une marque déposée de Celgene Corporation,  
utilisée sous licence par Celgene Inc.

Numéro de contrôle de la présentation : 232761

## TABLE DES MATIÈRES

<b>TABLE DES MATIÈRES .....</b>	<b>2</b>
<b>PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ .....</b>	<b>4</b>
<b>1 INDICATIONS .....</b>	<b>4</b>
1.1 Enfants : .....	4
1.2 Personnes âgées.....	4
<b>2 CONTRE-INDICATIONS .....</b>	<b>4</b>
<b>3 POSOLOGIE ET ADMINISTRATION .....</b>	<b>5</b>
3.1 Considérations posologiques.....	5
3.2 Posologie recommandée et modification posologique.....	7
3.3 Administration.....	8
3.4 Dose oubliée.....	8
<b>4 SURDOSAGE .....</b>	<b>8</b>
<b>5 FORMES POSOLOGIQUES, CONCENTRATIONS, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT .....</b>	<b>9</b>
<b>6 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS .....</b>	<b>9</b>
<b>Cardiovasculaire</b> .....	9
<b>Conduite de véhicules et utilisation de machines</b> .....	13
<b>Fonction hépatique/biliaire/pancréatique</b> .....	13
<b>Système Immunitaire</b> .....	14
<b>Néoplasmes</b> .....	16
<b>Système nerveux</b> .....	17
<b>Ophtalmologique</b> .....	18
<b>Psychiatrie</b> .....	19
<b>Santé sexuelle</b> .....	19
6.1 Populations particulières.....	20
<b>7 EFFETS INDÉSIRABLES .....</b>	<b>22</b>
7.1 Aperçu des effets indésirables.....	22
7.2 Effets indésirables identifiés lors des essais cliniques.....	22
7.3 Effets indésirables peu courants identifiés lors des essais cliniques (< 1 %).....	26
7.4 Résultats de laboratoire anormaux : hématologie, chimie clinique et autres données quantitatives.....	27
<b>8 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES .....</b>	<b>28</b>
8.1 Aperçu .....	28
8.2 Interactions médicament-médicament.....	29
8.3 Interactions médicament-aliment.....	31
8.4 Interactions médicament-plante médicinale.....	31
8.5 Interactions médicament-épreuves de laboratoire.....	31
<b>9 MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE.....</b>	<b>31</b>
9.1 Mode d'action .....	31

9.2	Pharmacodynamie.....	32
9.3	Pharmacocinétique.....	32
<b>10</b>	<b>ENTREPOSAGE, STABILITÉ ET Traitement.....</b>	<b>35</b>
<b>11</b>	<b>RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES .....</b>	<b>36</b>
<b>12</b>	<b>ESSAIS CLINIQUES.....</b>	<b>36</b>
12.1	Conception de l'essai et aspects démographiques de l'étude.....	36
12.2	Résultats des études.....	38
<b>13</b>	<b>TOXICOLOGIE NON CLINIQUE.....</b>	<b>39</b>
	<b>RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT .....</b>	<b>43</b>

## PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ

### 1 INDICATIONS

ZEPOSIA<sup>MD</sup> (ozanimod) est indiqué pour :

- le traitement des patients atteints de sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP RR) afin de diminuer la fréquence des exacerbations cliniques.

ZEPOSIA ne doit être prescrit que par des neurologues qui sont expérimentés dans le traitement de la sclérose en plaques, qui connaissent bien le profil d'efficacité et d'innocuité de ZEPOSIA et qui sont en mesure de discuter des bienfaits et des risques du traitement avec les patients.

#### 1.1 Enfants :

**Enfants (< 18 ans) :** Santé Canada ne dispose d'aucune donnée, par conséquent, l'indication d'utilisation dans la population pédiatrique n'est pas autorisée par Santé Canada.

#### 1.2 Personnes âgées

**Personnes âgées (≥ 65 ans) :** Santé Canada ne dispose d'aucune donnée, par conséquent l'indication d'utilisation dans la population gériatrique n'est pas autorisée par Santé Canada. Les médecins qui choisissent de traiter des patients gériatriques doivent envisager le traitement par ZEPOSIA en tenant compte de la fréquence accrue de réduction de la fonction hépatique, rénale, immunitaire, pulmonaire et cardiovasculaire ainsi que de la présence d'autres maladies concomitantes et d'une pharmacothérapie concomitante, justifiant une certaine prudence et pouvant nécessiter une surveillance supplémentaire ou plus fréquente (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Populations particulières).

### 2 CONTRE-INDICATIONS

- ZEPOSIA est contre-indiqué chez les patients ayant une hypersensibilité à ce médicament ou à l'un de ses ingrédients, y compris les ingrédients non médicinaux, ou à un composant du contenant. Pour obtenir la liste complète des ingrédients, voir la section FORMES POSOLOGIQUES, CONCENTRATIONS, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT.
- Patients qui, au cours des 6 mois précédents, ont présenté un infarctus du myocarde, une angine de poitrine instable, un accident vasculaire cérébral (AVC), un accident ischémique transitoire (AIT), une insuffisance cardiaque décompensée nécessitant une hospitalisation ou une insuffisance cardiaque de classe III/IV (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Appareil cardiovasculaire).
- Patients qui présentent ou ont déjà présenté un bloc auriculoventriculaire (AV) du deuxième degré de type II ou un bloc AV du troisième degré, une maladie du sinus ou un bloc sino-auriculaire (à moins que le patient ne porte un stimulateur cardiaque fonctionnel) (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire).

- Patients présentant un risque accru d'infections opportunistes, y compris les patients qui sont immunodéprimés en raison d'un traitement (p. ex. traitements antinéoplasiques, immunosuppresseurs ou immunomodulateurs, irradiation lymphoïde totale ou greffe de moelle osseuse) ou d'une maladie (p. ex. syndrome d'immunodéficience).
- Patients atteints d'une infection active grave, y compris d'une infection bactérienne, fongique ou virale active (p. ex. hépatite, tuberculose), jusqu'à la résolution de l'infection (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Système immunitaire).
- Patients atteints de tumeurs malignes actives connues, à l'exception du carcinome basocellulaire localisé de la peau (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Néoplasme).
- Femmes (y compris les adolescentes) enceintes ou en âge de procréer qui n'utilisent aucune méthode de contraception efficace. Toute grossesse doit être exclue avant le début du traitement, car ZEPOSIA pourrait nuire au fœtus (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS).
- Inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAO) concomitants : ZEPOSIA ne devrait pas être administré avec d'autres inhibiteurs de la MAO en raison du risque accru d'inhibition non sélective de la MAO pouvant entraîner une crise hypertensive.

### **3 POSOLOGIE ET ADMINISTRATION**

#### **3.1 Considérations posologiques**

Avant d'amorcer le traitement par ZEPOSIA, les évaluations suivantes doivent être faites pour guider la sélection et le traitement du patient :

##### Effets sur le système immunitaire

ZEPOSIA réduit le nombre de lymphocytes circulants à environ 43-47 % des valeurs initiales avec la dose de 0,92 mg d'ozanimod, en raison de leur rétention réversible dans les organes lymphoïdes, ce qui peut accroître le risque d'infections. Les prescripteurs devraient :

- Examiner un hémogramme récent (c'est-à-dire obtenu au cours des 6 derniers mois) (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Immunitaire).
- Il n'existe aucune donnée clinique sur l'efficacité et l'innocuité des vaccins chez les patients prenant ZEPOSIA. Il faut éviter d'utiliser des vaccins vivants atténués pendant le traitement par ZEPOSIA et au cours des 3 mois qui suivent l'arrêt du traitement.
- Vérifier le statut des anticorps contre le virus varicelle-zona (VVZ) en l'absence d'antécédents de varicelle ou de vaccination contre la varicelle confirmés par un professionnel de la santé; la vaccination contre le VVZ est recommandée chez les patients séronégatifs, après quoi il faut attendre un mois avant d'instaurer le traitement par ZEPOSIA (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Système immunitaire).
- Retarder l'instauration du traitement par ZEPOSIA chez les patients atteints d'une infection active grave jusqu'à ce que celle-ci soit résolue (voir CONTRE-INDICATIONS).

### Effets cardiaques

L'instauration du traitement par ZEPOSIA entraîne une diminution transitoire de la fréquence cardiaque ainsi que des retards dans la conduction auriculoventriculaire. Les prescripteurs devraient :

- Obtenir un électrocardiogramme (ECG) chez tous les patients, afin de vérifier la présence d'anomalies de la conduction préexistantes (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire – Recommandations concernant l'instauration du traitement).
- Déterminer si les patients prennent des médicaments concomitants qui réduisent la fréquence cardiaque ou la conduction auriculoventriculaire (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire – Recommandations concernant l'instauration du traitement; et INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES).
- Chez les patients présentant une bradycardie sinusale (fréquence cardiaque < 55 battements par minute [bpm]) ou un bloc auriculoventriculaire (AV) du premier ou du deuxième degré [type Mobitz I] ou ayant des antécédents d'infarctus du myocarde ou d'insuffisance cardiaque, il faut se préparer à administrer la première dose de ZEPOSIA dans un cadre clinique permettant de surveiller les signes et symptômes d'une possible bradycardie chez le patient (avec des mesures du pouls et de la tension artérielle toutes les heures pendant au moins 6 heures) et de prendre en charge une éventuelle bradycardie symptomatique (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire – Recommandations concernant l'instauration du traitement).
- Chez les patients atteints de certaines autres affections cardiaques préexistantes, demander une évaluation par un cardiologue avant d'amorcer le traitement, afin d'évaluer la pertinence de ce dernier et de déterminer la stratégie la plus appropriée pour surveiller les effets cardiaques (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire – Recommandations concernant l'instauration du traitement).

### Évaluation ophtalmologique

Les patients ayant des antécédents de diabète sucré, d'uvéïte et de maladies sous-jacentes/coexistantes de la rétine courent un risque accru d'œdème maculaire. Chez les patients atteints de diabète sucré ou d'uvéïte ou ayant des antécédents de troubles de la rétine, une évaluation ophtalmique est recommandée avant et pendant le traitement par ZEPOSIA (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Ophtalmologique; et EFFETS INDÉSIRABLES, Œdème maculaire).

### Épreuves de la fonction hépatique

Les prescripteurs doivent obtenir des taux de transaminases et de bilirubine récents (c'est-à-dire mesurés dans les 6 derniers mois) (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Hépatique).

### Médicaments actuels ou antérieurs

Chez les patients qui prennent ou qui ont déjà pris des traitements antinéoplasiques, immunosuppresseurs ou immunomodulateurs, y compris d'autres traitements modificateurs de la maladie pour la sclérose en plaques ainsi que des corticostéroïdes, il faut tenir compte de la possibilité de survenue d'effets immunosuppresseurs additifs non désirés avant d'instaurer le traitement par ZEPOSIA (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Immunitaire – Infections; et MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Immunitaire – Traitement antérieur et concomitant avec des immunosuppresseurs ou des immunomodulateurs).

## 3.2 Posologie recommandée et modification posologique

### Instauration du traitement

Chez tous les patients, le traitement doit être instauré avec une trousse de départ qui dure 7 jours. Le schéma posologique initial à dose croissante de ZEPOSIA, du jour 1 au jour 7, est présenté ci-dessous au tableau 1. Après l'augmentation de la dose sur 7 jours, la dose d'entretien est de 0,92 mg une fois par jour par voie orale à partir du jour 8.

L'instauration du traitement par ZEPOSIA sans augmentation graduelle de la dose peut entraîner des réductions plus marquées de la fréquence cardiaque (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire).

**Tableau 1 Schéma à dose croissante**

Jours 1 à 4	0,23 mg une fois par jour
Jours 5 à 7	0,46 mg une fois par jour
Jours 8 et suivants	0,92 mg une fois par jour

### Reprise du traitement suite à une interruption de la thérapie

Si une dose de ZEPOSIA est oubliée au cours des 2 premières semaines de traitement, reprendre le traitement en utilisant le schéma à dose croissante décrit dans le tableau 1.

### Traitement d'entretien

La dose recommandée de ZEPOSIA est de 0,92 mg une fois par jour par voie orale.

### Reprise du traitement d'entretien suite à l'interruption de la thérapie

Le même schéma à dose croissante décrit au tableau 1 doit être suivi lorsque le traitement d'entretien par ZEPOSIA est interrompu :

- pendant plus de 7 jours consécutifs entre les jours 15 et 28 du traitement
- pendant plus de 14 jours consécutifs après le jour 28 du traitement

Lorsque le traitement d'entretien par ZEPOSIA est interrompu, les patients chez qui une surveillance est recommandée doivent être surveillés après l'administration de la première dose (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire – Recommandations concernant l'instauration du traitement).

Si l'interruption du traitement par ZEPOSIA après les 2 premières semaines de traitement est de plus courte durée que celle mentionnée ci-dessus, poursuivre le traitement comme prévu.

### Populations particulières

#### Insuffisance rénale

Aucun ajustement de la dose de ZEPOSIA n'est requis chez les patients atteints d'insuffisance rénale (voir la section MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, Pharmacocinétique, Populations particulières et états pathologiques, Insuffisance rénale).

### Insuffisance hépatique

L'effet d'une insuffisance hépatique sur la pharmacocinétique des principaux métabolites actifs de l'ozanimod n'a pas été établi. L'utilisation de ZEPOSIA chez les patients atteints d'insuffisance hépatique n'est pas recommandée.

### Enfants (moins de 18 ans)

Santé Canada n'a pas autorisé d'indication d'utilisation dans la population pédiatrique. (voir la section INDICATIONS).

### Patients âgés (65 ans ou plus)

Santé Canada n'a pas autorisé d'indication d'utilisation dans chez les patients âgés. Les médecins qui choisissent de prescrire ZEPOSIA à des patients gériatriques doivent tenir compte de la fréquence accrue de maladies et de pharmacothérapies concomitantes chez ce groupe, ce qui incite à la prudence.

## **3.3 Administration**

Les capsules de ZEPOSIA doivent être avalées entières et peuvent être prises avec ou sans nourriture.

## **3.4 Dose oubliée**

Voir ci-dessus (Reprise du traitement après l'interruption de ce dernier; Reprise du traitement d'entretien suite à l'interruption de la thérapie).

## **4 SURDOSAGE**

Les patients doivent être pris en charge au moyen de mesures symptomatiques et de soins de soutien.

Pour traiter une surdose présumée, communiquez avec le centre antipoison de votre région.

Chez les patients qui ont pris une surdose de ZEPOSIA, il est important de surveiller les signes et symptômes de bradycardie, ce qui peut inclure une surveillance de nuit dans un établissement médical. Des mesures régulières du pouls et de la tension artérielle sont nécessaires, et une surveillance continue de l'ECG devrait être effectuée. La diminution de la fréquence cardiaque induite par l'ozanimod peut être renversée par l'administration parentérale d'atropine ou d'isoprénaline.



## 5 FORMES POSOLOGIQUES, CONCENTRATIONS, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT

Tableau 2 Formes posologiques, concentrations, composition et conditionnement

Voie d'administration	Forme posologique/concentration /composition	Ingrédients non médicinaux
Orale	capsule de 0,23 mg, 0,46 mg et 0,92 mg	cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, dioxyde de silicium colloïdal, stéarate de magnésium Enveloppe de la capsule : dioxyde de titane (E171), encre pharmaceutique, gélatine, oxyde de fer jaune (E172), oxyde de fer noir (E172), oxyde de fer rouge (E172)

0,23 mg : capsules de gélatine dures et opaques de taille 4 avec un corps gris clair et une tête gris clair, portant les inscriptions à l'encre noire « OZA » sur la tête et « 0.23 mg » sur le corps.

0,46 mg : capsules de gélatine dures et opaques de taille 4 avec un corps gris clair et une tête orange, portant les inscriptions à l'encre noire « OZA » sur la tête et « 0.46 mg » sur le corps.

0,92 mg : capsules de gélatine dures et opaques de taille 4 avec un corps orange et une tête orange, portant les inscriptions à l'encre noire « OZA » sur la tête et « 0.92 mg » sur le corps.

La « trousse de départ » est un étui pliant contenant 7 capsules de gélatine dures sous plaquette alvéolée : 4 capsules de 0,23 mg et 3 capsules de 0,46 mg.

L'emballage standard d'un mois contient 28 capsules de gélatine dure de 0,92 mg sous plaquette alvéolée.

## 6 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

### Cardiovasculaire

#### Bradyarythmie et retards dans la conduction auriculoventriculaire

L'instauration du traitement par ZEPOSIA peut entraîner des réductions transitoires de la fréquence cardiaque et des retards de la conduction auriculoventriculaire (voir EFFETS INDÉSIRABLES).

ZEPOSIA n'a pas été étudié chez les patients atteints des affections suivantes :

- Infarctus du myocarde, angine de poitrine instable, accident vasculaire cérébral/accident ischémique transitoire, insuffisance cardiaque décompensée (nécessitant un traitement en milieu hospitalier) ou insuffisance cardiaque de classe III/IV selon la New York Heart Association (voir CONTRE-INDICATIONS).
- Troubles de la conduction ou du rythme cardiaque, y compris bloc de branche gauche complet, arrêt sinusal ou bloc sino-auriculaire, bradycardie symptomatique, maladie du sinus, bloc AV du deuxième degré de type Mobitz II ou bloc AV de degré supérieur (antécédents ou observé lors de la sélection), sauf si le patient porte un stimulateur cardiaque fonctionnel (voir CONTRE-INDICATIONS)
- Arythmies cardiaques nécessitant un traitement par des médicaments antiarythmiques de classe Ia ou III

- Allongement significatif de l'intervalle QT (QTcF > 450 ms chez les hommes; > 470 ms chez les femmes)
- Apnée du sommeil grave non traitée
- Fréquence cardiaque au repos inférieure à 55 bpm au départ

#### *Réduction de la fréquence cardiaque*

Dans les essais cliniques sur la SEP contrôlés par traitement actif, après l'administration de la dose initiale de 0,23 mg de ZEPOSIA, la plus grande réduction moyenne de la fréquence cardiaque (1,2 bpm) par rapport à sa valeur initiale s'est produite à l'heure 5 du jour 1, la fréquence cardiaque remontant par la suite près de sa valeur initiale à l'heure 6. Avec l'augmentation continue de la dose, l'effet maximal de l'ozanimod sur la fréquence cardiaque s'est produit le jour 8.

On n'a pas observé de fréquence cardiaque inférieure à 40 bpm. L'instauration du traitement par ZEPOSIA sans augmentation graduelle de la dose peut entraîner de plus grandes réductions de la fréquence cardiaque (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION).

Dans les études cliniques de phase 3, une bradycardie a été signalée le premier jour du traitement chez 0,6 % des patients traités par ZEPOSIA comparativement à aucun des patients ayant reçu l'interféron (IFN) bêta-1a. Après le jour 1, l'incidence de bradycardie était de 0,8 % chez les patients traités par ZEPOSIA contre 0,7 % chez les patients ayant reçu l'IFN bêta-1a.

#### *Retards dans la conduction auriculoventriculaire*

L'instauration du traitement par ZEPOSIA peut entraîner des retards transitoires dans la conduction auriculoventriculaire. Lors d'expositions à ZEPOSIA supérieures à la posologie recommandée sans augmentation graduelle de la dose, des blocs auriculoventriculaires de type I du premier et du deuxième degré ont été observés chez des volontaires sains; toutefois, dans les études cliniques de phase 3 avec augmentation graduelle de la dose, aucun bloc auriculoventriculaire du deuxième ou du troisième degré n'a été signalé chez les patients traités par ZEPOSIA.

Lorsqu'un traitement par ZEPOSIA est envisagé, une demande de consultation en cardiologie serait appropriée si le patient présente ce qui suit :

- Allongement significatif de l'intervalle QT (QTcF > 450 ms chez les hommes; > 470 ms chez les femmes)
- Arythmies nécessitant un traitement par des médicaments antiarythmiques de classe Ia ou III
- Cardiopathie ischémique, insuffisance cardiaque, antécédents d'arrêt cardiaque ou d'infarctus du myocarde, maladie cérébrovasculaire ou hypertension non maîtrisée
- Antécédents de bloc AV du deuxième degré de type Mobitz II ou AV de degré supérieur, de maladie du sinus ou de bloc cardiaque sino-auriculaire

#### Recommandations concernant l'instauration du traitement

L'instauration du traitement par ZEPOSIA entraîne une diminution transitoire de la fréquence cardiaque ainsi que des retards dans la conduction auriculoventriculaire. L'augmentation graduelle de la dose au début du traitement aide à réduire ces effets.

Pour tous les patients :

- Obtenir un ECG avant l'instauration du traitement pour déterminer la présence d'anomalies de la conduction préexistantes.
- Déterminer si le patient prend des médicaments concomitants qui peuvent réduire la fréquence cardiaque ou la conduction auriculoventriculaire (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Considérations posologiques).
- Déterminer si une évaluation par un cardiologue sera nécessaire avant de commencer le traitement.
- Utiliser un schéma à dose croissante pour aider à réduire les effets cardiaques au moment d'atteindre la dose d'entretien (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Posologie recommandée et modification posologique; MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire – Bradyarythmie et retards dans la conduction auriculoventriculaire; et EFFETS INDÉSIRABLES, Bradyarythmie).

Chez les patients qui présentent une bradycardie sinusale (fréquence cardiaque < 55 bpm), un bloc AV du premier ou du deuxième degré (type Mobitz I) ou qui ont des antécédents d'infarctus du myocarde ou d'insuffisance cardiaque :

- Administrer la première dose de ZEPOSIA dans un cadre clinique où le patient peut être surveillé pendant au moins 6 heures pour détecter l'apparition de signes et symptômes d'une possible bradycardie, avec des mesures du pouls et de la tension artérielle toutes les heures, et dans lequel une bradycardie symptomatique peut être prise en charge.
- Obtenir un ECG avant la prise de la dose et à la fin de la période d'observation de 6 heures.

Lorsqu'un traitement par ZEPOSIA est envisagé en présence d'une des affections cardiaques ci-dessous, il conviendrait de demander une évaluation par un cardiologue avant l'instauration du traitement, afin d'évaluer la pertinence de ce dernier et de déterminer la stratégie la plus appropriée pour surveiller les effets cardiaques.

- Allongement significatif de l'intervalle QT préexistant (QTcF > 450 ms chez les hommes; > 470 ms chez les femmes) (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire – Allongement de l'intervalle QT)
- Antécédents d'arrêt cardiaque, de maladie cérébrovasculaire, d'hypertension non maîtrisée ou d'apnée du sommeil grave non traitée; ZEPOSIA ne devrait pas être utilisé chez ces patients, car une bradycardie importante pourrait être mal tolérée.
- Antécédents de syncope récurrente ou de bradycardie symptomatique
- Traitement concomitant par des médicaments ralentissant la fréquence cardiaque

#### *Surveillance prolongée au-delà de 6 heures*

Une surveillance continue est requise si l'une des anomalies suivantes est observée après 6 heures (en présence ou non de symptômes), et ce, jusqu'à ce qu'elle se résorbe :

- Fréquence cardiaque < 45 bpm 6 heures après l'administration de la dose
- La valeur de fréquence cardiaque la plus basse est obtenue 6 heures après

l'administration de la dose, suggérant que la réduction maximale de la fréquence cardiaque pourrait ne pas s'être produite

- ECG réalisé 6 heures après l'administration de la dose montre l'apparition nouvelle d'un bloc AV du deuxième degré ou plus
- Intervalle QTc > 450 ms chez les hommes; > 470 ms chez les femmes

Si une bradycardie ou une bradyarythmie symptomatique ou des symptômes liés à une anomalie de la conduction surviennent après l'administration de la dose, ou si un ECG effectué 6 heures après l'administration de la dose montre l'apparition nouvelle d'un bloc AV du deuxième degré ou plus, ou un intervalle QTc > 450 ms chez les hommes et > 470 ms chez les femmes, une prise en charge appropriée doit être amorcée et la surveillance par ECG en continu doit se poursuivre jusqu'à la disparition des symptômes/anomalies, si aucune intervention pharmacologique n'est nécessaire. Si un patient nécessite une intervention pharmacologique pendant la période d'observation suivant la première dose, une surveillance continue pendant une nuit complète dans un établissement médical devrait être effectuée et les mêmes mesures de surveillance devraient être utilisées lors la deuxième dose de ZEPOSIA.

L'expérience avec ZEPOSIA est limitée chez les patients recevant un traitement concomitant par des médicaments ralentissant la fréquence cardiaque, y compris, sans s'y limiter, les bêtabloquants, les inhibiteurs des canaux calciques (comme le vérapamil ou le diltiazem), les cholinomimétiques ou d'autres substances susceptibles de diminuer la fréquence cardiaque (p. ex. l'ivabradine ou la digoxine). L'utilisation concomitante de ces substances lors de l'instauration du traitement par ZEPOSIA peut être associée à une bradycardie grave et à un bloc cardiaque.

Si l'administration concomitante d'un médicament connu pour ralentir la fréquence cardiaque est envisagée pendant l'instauration du traitement par ZEPOSIA, il conviendrait de demander l'avis d'un cardiologue concernant le recours à des médicaments ne ralentissant pas la fréquence cardiaque ou la surveillance appropriée au début du traitement.

### Tension artérielle élevée

Dans les études cliniques pivots, les patients traités par ZEPOSIA ont présenté une augmentation moyenne de la tension systolique d'environ 1 à 2 mm Hg par rapport aux patients ayant reçu l'IFN  $\beta$ -1a, mais aucun effet sur la tension diastolique n'a été observé.

L'augmentation de la tension systolique a été détectée pour la première fois après environ 3 mois de traitement et a persisté tout au long de ce dernier. Une hypertension (hypertension, hypertension essentielle et tension artérielle élevée) a été signalée comme effet indésirable chez 4,5 % des patients traités par ZEPOSIA à 0,92 mg et 2,3 % des patients sous IFN  $\beta$ -1a. Deux patients traités par ZEPOSIA à 0,92 mg et un patient traité par l'IFN  $\beta$ -1a ont présenté une crise hypertensive qui n'était pas clairement influencée par un médicament concomitant. La tension artérielle devrait être surveillée pendant le traitement par ZEPOSIA et prise en charge de manière appropriée.

Chez les patients traités par ZEPOSIA, certains aliments pouvant contenir de très grandes quantités (c'est-à-dire plus de 150 mg) de tyramine pourraient causer une hypertension grave en raison d'une interaction potentielle entre la tyramine et ZEPOSIA, même aux doses recommandées. En raison de leur sensibilité accrue à la tyramine, on devrait conseiller aux patients qui prennent ZEPOSIA d'éviter les aliments contenant une très grande quantité de cette substance pendant leur traitement.

Dans les études cliniques sur la SEP, des cas d'hypertension ont été plus fréquemment

signalés chez les patients traités par ZEPOSIA que chez les patients traités par l'IFN  $\beta$ -1a par voie IM ainsi que chez les patients recevant en concomitance ZEPOSIA et des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) ou des inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN) (voir EFFETS INDÉSIRABLES). La tension artérielle doit être régulièrement surveillée pendant le traitement par l'ozanimod.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Les effets du médicament sur la capacité de conduire un véhicule ou d'utiliser des machines n'ont pas été étudiés.

### **Fonction hépatique/biliaire/pancréatique**

#### Enzymes hépatiques élevées

Des élévations des aminotransférases peuvent survenir chez les patients recevant ZEPOSIA (voir EFFETS INDÉSIRABLES).

Procéder à des examens de la fonction hépatique si aucun résultat récent (moins de 6 mois) n'est disponible avant d'amorcer le traitement par ZEPOSIA (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION).

Lors des essais cliniques sur la SEP contrôlés par traitement actif, des élévations de l'ALT atteignant 5 fois la limite supérieure de la normale (LSN) ou plus sont survenues chez 1,6 % des patients traités par ZEPOSIA à 0,92 mg et 1,3 % des patients recevant l'IFN  $\beta$ -1a. Des élévations atteignant 3 fois la LSN ou plus ont été signalées chez 5,5 % des patients recevant ZEPOSIA et 3,1 % des patients recevant l'IFN  $\beta$ -1a. Le délai médian avant l'élévation 3 fois supérieure à la LSN était de 6 mois. La majorité des patients (79 %) ont poursuivi le traitement par ZEPOSIA, les valeurs revenant à < 3 fois la LSN en deçà de 2 à 4 semaines environ.

Dans les essais cliniques, le traitement par ZEPOSIA était arrêté lorsqu'une élévation supérieure à 5 fois la LSN était confirmée. Globalement, le taux d'abandon en raison d'élévations des enzymes hépatiques a été de 1,1 % chez les patients recevant ZEPOSIA à 0,92 mg et de 0,8 % chez les patients recevant l'IFN  $\beta$ -1a.

Pendant le traitement par ZEPOSIA, les taux des transaminases hépatiques et de bilirubine doivent être évalués au cours des 3 premiers mois du traitement, puis périodiquement ou lorsque cela est cliniquement justifié par la suite. En présence de taux de transaminases hépatiques supérieurs à 5 fois la LSN, une surveillance plus fréquente devrait être mise en place, y compris des mesures de la bilirubine et de la phosphatase alcaline sériques. Le traitement par ZEPOSIA devrait être interrompu en cas de confirmation répétée de taux de transaminases hépatiques supérieurs à 5 fois la LSN et ne devrait être recommencé que lorsque les taux de transaminases hépatiques se sont normalisés.

Les patients qui se mettent à présenter des signes et symptômes (inexpliqués) suggérant un dysfonctionnement hépatique, tels des nausées, des vomissements, une douleur abdominale, de la fatigue, de l'anorexie, une jaunisse et/ou des urines foncées, devraient subir une analyse des enzymes hépatiques et ZEPOSIA devrait être arrêté si une atteinte hépatique significative est confirmée. Les patients présentant une maladie hépatique préexistante peuvent courir un risque accru d'élévation des enzymes hépatiques lorsqu'ils prennent ZEPOSIA.

Il n'existe aucune donnée démontrant un risque accru d'élévation des résultats aux examens de la fonction hépatique (EFH) associé à la prise de ZEPOSIA chez les patients présentant une maladie hépatique préexistante (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION – Populations particulières).

## **Systeme Immunitaire**

### Infections

ZEPOSIA entraîne une réduction moyenne du nombre de lymphocytes dans le sang périphérique à 43-47 % des valeurs initiales avec la dose de 0,92 mg d'ozanimod en raison de la rétention réversible des lymphocytes dans les tissus lymphoïdes. ZEPOSIA peut donc accroître la vulnérabilité aux infections, certaines pouvant être graves. Des infections menaçant le pronostic vital et, dans de rares cas, mortelles sont survenues chez des patients recevant ZEPOSIA.

Avant, pendant et après l'arrêt de traitement par ZEPOSIA, les précautions suivantes devraient être prises :

- Obtenir les résultats d'un hémogramme (y compris le nombre de lymphocytes) récent (c.-à-d. datant de moins de 6 mois ou suivant l'arrêt d'un traitement antérieur contre la SEP) avant l'instauration du traitement par ZEPOSIA (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION).
- L'instauration du traitement par ZEPOSIA doit être retardée chez les patients qui présentent une infection active, et ce, jusqu'à la résolution de celle-ci.
- Déterminer le statut d'immunisation contre le VVZ (voir la section Vaccinations ci-dessous).
- Des hémogrammes sont également recommandés périodiquement pendant le traitement. Un nombre absolu de lymphocytes  $< 0,2 \times 10^9/L$ , confirmé par des analyses répétées, devrait entraîner l'interruption du traitement par l'ozanimod, jusqu'à ce que le taux remonte à  $> 0,5 \times 10^9/L$ , après quoi on peut envisager la reprise de l'ozanimod.
- Il faut dire aux patients qui reçoivent un traitement par ZEPOSIA de signaler rapidement les symptômes d'infection à leur médecin afin de faciliter la mise en place rapide de stratégies diagnostiques et thérapeutiques efficaces.
- La suspension du traitement par ZEPOSIA devrait être envisagée en cas d'apparition d'une infection grave.
- Étant donné que l'élimination de l'ozanimod peut prendre jusqu'à 3 mois après l'arrêt du traitement, la surveillance des infections doit être maintenue pendant toute cette période.

Dans les études cliniques pivots, le taux global d'infections et le taux d'infections graves chez les patients traités par ZEPOSIA à 0,92 mg était comparable à celui des patients qui ont reçu l'IFN bêta-1a (35,1 % contre 34,5 %, et 1 % contre 0,8 %, respectivement). ZEPOSIA a augmenté le risque d'infection virale des voies respiratoires supérieures, d'infection des voies urinaires et de zona (voir EFFETS INDÉSIRABLES).

La proportion de patients dont le nombre de lymphocytes était inférieur à  $0,2 \times 10^9/L$  était de 3,3 %. Ces valeurs sont généralement remontées à plus de  $0,2 \times 10^9/L$  avec la poursuite du traitement par ZEPOSIA. Après l'arrêt de ZEPOSIA à 0,92 mg, le délai médian avant le retour du nombre de lymphocytes du sang périphérique dans l'intervalle normal était de 30 jours, environ 90 % des patients revenant à l'intervalle normal de 3 mois.

### *Infections herpétiques*

Dans les études cliniques pivots, un zona a été signalé comme effet indésirable chez 0,6 % des patients traités par ZEPOSIA à 0,92 mg et 0,2 % des patients sous IFN bêta-1a. Des cas d'encéphalite causée par le virus herpès simplex et de méningite causée par le virus varicelle-zona ont été signalés avec certains modulateurs du récepteur de la sphingosine 1-phosphate (S1P).

Les médecins doivent être attentifs aux symptômes cliniques évoquant des infections herpétiques graves. Dans les cas d'infection herpétique disséminée, le traitement doit suivre les lignes directrices actuelles en vigueur.

Les patients qui n'ont pas d'antécédents de varicelle confirmés par un professionnel de la santé ou qui ne disposent d'aucune preuve documentée de vaccination complète contre le virus varicelle-zona (VVZ), devraient subir un test de détection des anticorps anti-VVZ avant d'amorcer le traitement par ZEPOSIA (voir Vaccins ci-dessous).

### *Infection cryptococcique*

Des cas de méningite cryptococcique (MC) mortelle et d'infections cryptococciques disséminées ont été signalés avec des modulateurs du récepteur de la S1P. Les médecins doivent être vigilants quant aux signes ou symptômes cliniques de MC. Les patients qui présentent des signes ou symptômes évoquant une infection cryptococcique doivent être rapidement évalués et traités. Le traitement par ZEPOSIA doit être suspendu jusqu'à ce qu'une infection cryptococcique ait été exclue. Si une MC est diagnostiquée, un traitement approprié doit être instauré.

### *Leuco-encéphalopathie multifocale progressive (LEMP)*

La LEMP est une infection virale opportuniste du cerveau causée par le virus John Cunningham (VJC) qui touche habituellement les patients immunodéprimés et qui peut entraîner la mort ou une incapacité grave.

Des infections par le VJC causant une LEMP ont été observées avec des traitements contre la SEP et associées à certains facteurs de risque (p. ex. polythérapie comprenant des immunosuppresseurs, patients gravement immunodéprimés).

Les symptômes typiquement associés à la LEMP sont hétérogènes, évoluent sur plusieurs jours ou plusieurs semaines et comprennent une faiblesse progressive d'un côté du corps ou une maladresse touchant les membres, des troubles de la vision et des changements dans la pensée, la mémoire et l'orientation entraînant de la confusion et des changements de personnalité.

Les médecins doivent être vigilants aux symptômes cliniques ou aux résultats de l'IRM pouvant suggérer une LEMP. Les signes de la maladie peuvent apparaître à l'IRM avant les signes ou symptômes cliniques. En cas de suspicion d'une LEMP, le traitement par l'ozanimod doit être suspendu jusqu'à ce que la LEMP ait été exclue. Si une LEMP est confirmée, le traitement par ZEPOSIA doit être interrompu.

### Vaccins

Les patients qui n'ont pas d'antécédents de varicelle confirmés par un professionnel de la santé ou qui n'ont aucune preuve documentée de vaccination complète contre le VVZ devraient subir un test de détection des anticorps anti-VVZ avant d'amorcer le traitement par ZEPOSIA. Une vaccination complète contre la varicelle est recommandée chez les patients séronégatifs avant l'instauration du traitement par ZEPOSIA, qui devrait être retardé d'un mois (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION).

Des infections par le virus du papillome humain (VPH), y compris des papillomes, des dysplasies, des verrues et des cancers liés au VPH, ont été signalées pendant le traitement par un autre modulateur du récepteur de la S1P, après la commercialisation du produit. En raison des propriétés immunosuppressives de l'ozanimod, une vaccination contre le VPH devrait être envisagée avant l'instauration du traitement par ZEPOSIA en tenant compte des recommandations de vaccination. Un dépistage du cancer, notamment au moyen d'un test Pap, est recommandé dans le cadre des soins standards.

Comme pour les autres médicaments agissant sur le système immunitaire, les recommandations relatives à l'immunisation des adultes (population générale et groupes à risque particuliers) provenant du Guide canadien d'immunisation (<https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/guide-canadien-immunisation-partie-3-vaccination-populations-particulieres.html>) et d'experts locaux en maladies infectieuses doivent être prises en compte lors de l'évaluation de la nécessité d'autres vaccins, avant et pendant le traitement par ZEPOSIA.

Il n'existe aucune donnée clinique sur l'efficacité et l'innocuité des vaccins chez les patients prenant ZEPOSIA. Il faut éviter d'utiliser des vaccins vivants atténués pendant le traitement par ZEPOSIA et au cours des 3 mois qui suivent son arrêt.

La vaccination contre le virus varicelle-zona (VVZ) des patients sans immunité documentée contre le VVZ est recommandée au moins un mois avant le début du traitement par ZEPOSIA (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION).

#### Traitement antérieur et concomitant par des agents antinéoplasiques, immunosuppresseurs ou immunomodulateurs

Dans les études cliniques, les patients recevant ZEPOSIA ne pouvaient être traités simultanément par des agents antinéoplasiques, immunosuppresseurs non corticostéroïdiens ou immunomodulateurs pour leur SEP. L'utilisation concomitante de ZEPOSIA avec l'un de ces traitements augmenterait vraisemblablement le risque d'immunosuppression. Les traitements antinéoplasiques, immunomodulateurs ou immunosuppresseurs (y compris les corticostéroïdes) doivent être coadministrés avec prudence en raison du risque d'effets additifs sur le système immunitaire durant leur utilisation. Lorsqu'on administre ZEPOSIA en remplacement d'un médicament immunosuppresseur, il faut prendre en considération la durée des effets et le mode d'action de ce dernier afin d'éviter les effets immunosuppresseurs additifs non désirés.

Le traitement par ZEPOSIA peut généralement être amorcé immédiatement après l'arrêt de l'interféron bêta ou de l'acétate de glatiramère.

#### Effets sur le système immunitaire suivant l'arrêt de ZEPOSIA

Après l'arrêt du traitement par ZEPOSIA, le nombre de lymphocytes revient habituellement à la normale dans un délai médian de 30 jours, et environ 90 % des patients se situent dans l'intervalle normal en deçà de 3 mois. Cependant, l'utilisation d'immunosuppresseurs pendant cette période peut entraîner un effet additif sur le système immunitaire. Les médecins qui choisissent d'amorcer un nouveau traitement immunosuppresseur dans les 1 à 3 mois suivant la dernière dose de ZEPOSIA doivent tenir compte du fait que les principaux métabolites actifs de l'ozanimod pourraient encore se trouver dans le sang.

### **Néoplasmes**

Des tumeurs malignes ont été signalées avec ZEPOSIA lors d'essais cliniques.



Chez les patients traités par des médicaments immunosuppresseurs ou immunomodulateurs, y compris les modulateurs du récepteur de la S1P, il existe un risque potentiellement accru de tumeurs malignes, en particulier de la peau.

Dans les études contrôlées de phase 3, des cas de carcinome basocellulaire ont été signalés avec une incidence similaire chez les patients traités par ZEPOSIA (0,2 %, 3 patients) et les patients ayant reçu l'IFN bêta-1a (0,1 %, 1 patient). Les autres tumeurs malignes de la peau, y compris les mélanomes *in situ* malins (< 0,1 %, 1 patient) et les kératoacanthomes (< 0,1 %, 1 patient), n'ont été signalées que chez les patients traités par ZEPOSIA. La vigilance à l'égard des néoplasmes cutanés est recommandée chez les patients traités par ZEPOSIA. Il est conseillé aux professionnels de la santé et aux patients de surveiller les lésions cutanées suspectes avant d'amorcer le traitement par ZEPOSIA, puis régulièrement pendant ce dernier, en particulier chez les patients présentant des facteurs de risque de cancer de la peau. Si une lésion suspecte est observée, elle doit être évaluée rapidement. Comme il existe un risque potentiel de tumeurs malignes de la peau, les patients traités par ZEPOSIA doivent être mis en garde contre l'exposition au soleil et aux rayons ultraviolets et doivent être encouragés à porter des vêtements protecteurs et à utiliser des écrans solaires ayant un facteur de protection élevé. Les patients ne doivent pas recevoir un traitement concomitant par photothérapie UVB ou photochimiothérapie PUVA.

## **Systeme nerveux**

### Syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible (SEPR)

De rares cas de syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible (SEPR) ont été signalés chez des patients recevant un modulateur du récepteur de la S1P.

Lors d'essais cliniques contrôlés sur ZEPOSIA, un cas de SEPR a été signalé chez un patient atteint du syndrome de Guillain-Barré.

Un patient traité par ZEPOSIA qui présente des signes/symptômes neurologiques ou psychiatriques inattendus (p. ex. déficits cognitifs, changements de comportement, troubles visuels corticaux ou tout autre signe ou symptôme neurologique cortical) ou tout signe/symptôme suggérant une augmentation de la pression intracrânienne ou une détérioration neurologique accélérée, devrait subir un examen physique et neurologique complet dans les plus brefs délais et possiblement un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM). Les symptômes du SEPR sont habituellement réversibles, mais ils peuvent aussi évoluer vers un AVC ischémique ou une hémorragie cérébrale. Un retard dans le diagnostic et le traitement peut entraîner des séquelles neurologiques permanentes.

En cas de SEPR présumé, le traitement par ZEPOSIA doit être interrompu.

### Augmentation de l'activité de la maladie suivant l'arrêt de ZEPOSIA

Des exacerbations graves de la maladie, y compris un rebond de la maladie, ont été signalées dans quelques rares cas après l'arrêt d'un autre modulateur du récepteur de la S1P. La possibilité d'une exacerbation grave de la maladie après l'arrêt du traitement par ZEPOSIA devrait être envisagée. Les patients doivent être observés pour déceler les signes pertinents d'une éventuelle exacerbation grave ou du retour d'une activité élevée de la maladie après l'arrêt de ZEPOSIA; un traitement approprié doit être amorcé au besoin.

## Toxicité sérotoninergique/syndrome sérotoninergique

Des études *in vitro* ont montré que le CC112273 et le CC1084037, les métabolites actifs de l'ozanimod, sont des inhibiteurs sélectifs de la monoamine oxydase B (MAO-B) (voir INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, Inhibiteurs de la monoamine oxydase). L'utilisation concomitante d'inhibiteurs de la MAO, y compris les inhibiteurs sélectifs de la MAO-B, et de médicaments sérotoninergiques ou opioïdes a été associée à l'apparition d'une toxicité sérotoninergique, également connue sous le nom de syndrome sérotoninergique (voir INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES, Médicaments adrénergiques et sérotoninergiques). Dans les essais cliniques, un petit nombre de patients traités par ZEPOSIA ont été exposés de façon concomitante à des médicaments sérotoninergiques ou opioïdes sans qu'aucune toxicité sérotoninergique ne soit signalée. Toutefois, cette exposition n'était pas suffisante pour exclure la possibilité d'un effet indésirable résultant de la coadministration.

La toxicité sérotoninergique se caractérise par une excitation neuromusculaire, une stimulation du système nerveux autonome (p. ex. tachycardie, bouffées vasomotrices) et une altération de l'état mental (p. ex. anxiété, agitation, hypomanie). Selon les critères de Hunter, un diagnostic de toxicité sérotoninergique est probable lorsque, en présence d'au moins un agent sérotoninergique, l'un des éléments suivants est observé :

- Clonus spontané
- Clonus inductible ou clonus oculaire avec agitation ou diaphorèse
- Tremblements et hyperréflexie
- Hypertonie et température corporelle > 38 °C et clonus oculaire ou clonus inductible

Par conséquent, l'utilisation concomitante de ZEPOSIA avec des inhibiteurs du recaptage de la sérotonine-norépinéphrine (IRSN), des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS), des médicaments opioïdes (p. ex. mépéridine et ses dérivés, méthadone, propoxyphène, tramadol, tapentadol), des antidépresseurs tricycliques, tétracycliques ou triazolopyridiniques, la cyclobenzapriline ou le millepertuis n'est pas recommandée (voir Interactions médicamenteuses). Lorsque la coadministration de ZEPOSIA et d'un médicament sérotoninergique ou opioïde est cliniquement nécessaire, une observation étroite du patient est conseillée, en particulier au début du traitement et lors des augmentations de la dose (voir Interactions médicamenteuses).

Si l'on soupçonne une toxicité sérotoninergique, l'arrêt des agents sérotoninergiques doit être envisagé.

## **Ophtalmologique**

### Œdème maculaire

Dans les essais cliniques sur le traitement de la SEP par ZEPOSIA contrôlés par traitement actif, un œdème maculaire a été observé chez un (0,1 %) patient ayant reçu ZEPOSIA à 0,92 mg et chez 3 (0,3 %) patients ayant reçu ZEPOSIA à 0,46 mg, mais chez aucun patient sous IFN β-1a. Les patients chez qui on a observé un œdème maculaire présentaient des facteurs de risque préexistants. Une évaluation ophtalmique du fond de l'œil, y compris de la macula, est recommandée chez tous les patients si des changements de vision sont notés pendant la prise de ZEPOSIA. La poursuite du traitement par ZEPOSIA chez les patients qui présentent un œdème maculaire n'a pas été évaluée. La décision d'interrompre ou non le traitement par ZEPOSIA doit tenir compte des bienfaits et des risques potentiels pour chaque patient.

### *Cédème maculaire chez les patients ayant des antécédents d'uvéïte ou de diabète sucré*

Les patients qui ont des antécédents de diabète sucré, d'uvéïte et de maladies de la rétine sous-jacentes/coexistantes courent un risque accru d'œdème maculaire et doivent être soigneusement évalués avant et pendant le traitement par ZEPOSIA. L'incidence d'œdème maculaire est également plus élevée chez les patients atteints de SEP qui ont des antécédents d'uvéïte. Outre l'examen du fond de l'œil, y compris de la macula, avant le traitement, les patients atteints de SEP et présentant un diabète sucré ou des antécédents d'uvéïte devraient subir des examens de suivi réguliers.

## **Psychiatrie**

### Dépression et suicide

La dépression et les idées suicidaires sont connues pour être plus fréquentes dans la population atteinte de SEP. Aucun lien entre l'apparition de dépression et/ou d'idées suicidaires et l'utilisation de ZEPOSIA n'a été établi. Une incidence similaire de dépression a été observée chez les patients traités par l'IFN  $\beta$ -1a et les patients traités par ZEPOSIA dans les essais cliniques sur la SEP contrôlés par traitement actif (2,8 % contre 2,6 %, respectivement). Il faut conseiller aux patients traités par ZEPOSIA de signaler immédiatement tout symptôme de dépression et/ou toute idée suicidaire à leur médecin traitant. En cas d'apparition d'une dépression, l'instauration d'un traitement antidépresseur ou l'arrêt du traitement par ZEPOSIA devrait être envisagé.

## **Appareil respiratoire**

Des réductions du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) absolu, dépendantes de la dose, ont été observées chez les patients traités par ZEPOSIA aussi tôt que 3 mois après le début du traitement. Des analyses groupées des études pivots (SUNBEAM et RADIANCE) ont montré que la baisse du VEMS absolu par rapport au départ chez les patients traités par ZEPOSIA comparativement aux patients ayant reçu l'IFN bêta-1a était de 60 mL (IC à 95 % : -100, -20) à 12 mois. La différence moyenne en pourcentage du VEMS prédit à 12 mois entre les patients traités par ZEPOSIA et les patients ayant reçu l'IFN bêta-1a était de 1,9 % (IC à 95 % : -2,9, -0,8). Des réductions de la capacité vitale forcée (CVF) (valeur absolue et % de la valeur prédite), dépendantes de la dose, ont également été observées au troisième mois selon les analyses groupées comparant les patients traités par ZEPOSIA aux patients ayant reçu l'IFN  $\beta$ -1a (60 mL, IC à 95 % : -110, -10; 1,4 %, IC à 95 % : -2,6, -0,2), bien qu'aucune réduction significative n'ait été observée à d'autres moments. Les données sont insuffisantes pour déterminer la réversibilité de la diminution du VEMS ou de la CVF après l'arrêt du médicament. Un patient a cessé de prendre ZEPOSIA en raison d'une dyspnée. Une évaluation spirométrique de la fonction respiratoire doit être effectuée pendant le traitement par ZEPOSIA, si cela est cliniquement indiqué.

## **Santé sexuelle**

### **Reproduction**

#### Risque pour le fœtus

Aucune étude adéquate et bien contrôlée n'a été menée chez des femmes enceintes. Chez le rat et le lapin, l'administration d'ozanimod pendant l'organogenèse a été bien tolérée par les mères, mais a entraîné une mortalité embryofœtale, une ossification anormale/retardée et des anomalies des viscères et des gros vaisseaux sanguins chez la progéniture. L'exposition générale à la dose sans effet nocif observé (DSENO) pour la toxicité embryofœtale était 3,5 fois

supérieure (rat) et inférieure (lapin) à l'exposition générale au médicament actif total (ozanimod combiné aux principaux métabolites pharmacologiquement actifs chez l'humain, le CC112273 et le CC1084037) administré à la dose maximale recommandée chez l'humain (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Populations particulières, Femmes enceintes et TOXICOLOGIE NON CLINIQUE).

### Contraception

Les femmes (y compris les adolescentes) en âge de procréer doivent être informées que des études menées chez les animaux ont montré que l'ozanimod est nocif pour le fœtus en développement. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une méthode de contraception efficace (associée à un taux de grossesses inférieur à 1 %) pendant le traitement par ZEPOSIA et au cours des 3 mois qui suivent l'arrêt de ZEPOSIA. ZEPOSIA est contre-indiqué chez les femmes (y compris les adolescentes) qui sont enceintes ou qui sont en âge de procréer et qui n'utilisent pas une méthode de contraception efficace (voir CONTRE-INDICATIONS; et voir ci-dessous Populations particulières - Femmes en âge de procréer).

### **Fertilité**

Aucune donnée sur la fertilité chez l'humain n'est disponible. Dans les études sur les animaux, aucun effet indésirable sur la fertilité n'a été observé (voir TOXICOLOGIE NON CLINIQUE, Toxicologie de la reproduction et du développement).

## **6.1 Populations particulières**

### **6.1.1 Femmes en âge de procréer**

ZEPOSIA est contre-indiqué chez les femmes (y compris les adolescentes) qui sont enceintes ou qui sont en âge de procréer et qui n'utilisent aucune méthode de contraception efficace (voir CONTRE-INDICATIONS). Par conséquent, avant d'amorcer le traitement chez les femmes en âge de procréer, un test de grossesse négatif doit être obtenu et des conseils doivent être fournis aux patientes concernant le risque grave pour le fœtus. Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une méthode de contraception efficace durant le traitement et pendant au moins 3 mois après l'arrêt de ZEPOSIA, car il faut environ 3 mois pour que les métabolites actifs CC112273 et CC1084037 soient éliminés de l'organisme après l'arrêt du traitement, et les risques potentiels pour le fœtus peuvent persister pendant ce temps (voir MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, Pharmacocinétique). Si une femme devient enceinte pendant qu'elle prend ce médicament, elle doit être informée du risque pour le fœtus.

### **6.1.2 Femmes enceintes**

ZEPOSIA est contre-indiqué chez les femmes (y compris les adolescentes) qui sont enceintes ou qui sont en âge de procréer et qui n'utilisent aucune méthode de contraception efficace (voir CONTRE-INDICATIONS).

Il n'existe pas de données adéquates sur les risques pour le développement du fœtus associés à l'utilisation de ZEPOSIA chez les femmes enceintes. Il a été démontré que le récepteur visé par l'ozanimod (sphingosine-1-phosphate) joue un rôle important dans l'embryogenèse, notamment dans le développement vasculaire et neural. L'expérience clinique (données suivant la commercialisation et données de registre des grossesses) suggère que l'utilisation d'un autre modulateur du récepteur de la S1P est associée à un risque accru de malformation congénitale majeure globale lorsqu'il est administré pendant la grossesse, comparativement à la prévalence observée dans la population générale. Le type de malformations signalées avec l'autre

modulateur du récepteur de la S1P est semblable à celui observé dans la population générale, avec une augmentation de la prévalence des cardiopathies congénitales (p. ex. communication interauriculaire), des anomalies rénales et des anomalies musculosquelettiques.

D'après son mode d'action et les données chez les animaux, ZEPOSIA peut entraîner des effets nocifs chez le fœtus lorsqu'il est administré aux femmes enceintes. Des études sur la reproduction et le développement menées chez des rates et des lapines gravides ont démontré que l'ozanimod induit une embryotoxicité, une fœtotoxicité et une tératogénicité chez ces deux espèces (voir TOXICOLOGIE NON CLINIQUE). Dans les études sur la toxicité embryofœtale, des effets néfastes pour la mère ou une toxicité fœtale pendant l'embryogenèse ont été observés à des doses supérieures à 1 mg/kg/jour chez le rat et à des doses supérieures à 0,2 mg/kg/jour chez le lapin. Ces doses chez les rats et les lapins ont produit des effets tératogènes chez les deux espèces. Les manifestations de toxicité fœtale comprenaient une mortalité embryofœtale, une ossification anormale ou retardée, des anomalies viscérales et des malformations des gros vaisseaux. L'exposition générale à la dose sans effet nocif observé (DSENO) pour la toxicité embryofœtale était 3,5 fois supérieure (rate) et inférieure (lapine) à l'exposition générale au médicament actif total (ozanimod combiné aux principaux métabolites pharmacologiquement actifs chez l'humain, le CC112273 et le CC1084037) à la dose maximale recommandée chez l'humain.

Les femmes doivent être informées qu'il existe un risque potentiel pour le fœtus si ZEPOSIA est utilisé pendant la grossesse ou si une grossesse survient pendant la prise de ce médicament (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS et TOXICOLOGIE NON CLINIQUE, Toxicologie de la reproduction et du développement). Comme il faut environ 3 mois pour que les métabolites actifs de l'ozanimod soient éliminés de l'organisme après l'arrêt du traitement, il faut interrompre ZEPOSIA au moins 3 mois avant de planifier une grossesse. Des conseils médicaux doivent être fournis sur le risque d'effets nocifs pour le fœtus associés au traitement, et des examens médicaux de suivi (p. ex. échographie) doivent être effectués. La possibilité d'une exacerbation grave de la maladie doit être envisagée chez les femmes qui cessent de prendre ZEPOSIA en raison d'une grossesse ou d'une grossesse prévue (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Neurologique - Retour de l'activité de la maladie [rebond] après l'arrêt de ZEPOSIA).

### **6.1.3 Allaitement**

Une étude sur des rates en lactation recevant l'ozanimod a montré que l'ozanimod et ses métabolites sont excrétés dans le lait à des concentrations plus élevées que les concentrations plasmatiques de la mère (voir TOXICOLOGIE NON CLINIQUE, Toxicologie de la reproduction et du développement). Il n'existe aucune donnée sur la présence de l'ozanimod dans le lait maternel, ni sur les effets de ce dernier sur le nourrisson allaité ou la production de lait. Comme de nombreux médicaments sont excrétés dans le lait maternel et puisqu'il existe un risque de réactions indésirables à l'ozanimod et à ses métabolites chez les nourrissons allaités, les femmes qui reçoivent ZEPOSIA ne devraient pas allaiter.

### **6.1.4 Enfants**

**Enfants (< 18 ans) :** Santé Canada ne dispose d'aucune donnée, par conséquent, l'indication d'utilisation dans la population pédiatrique n'est pas autorisée par Santé.

### **6.1.5 Personnes âgées**

L'innocuité et l'efficacité de ZEPOSIA chez les patients âgés de 65 ans et plus n'ont pas été

étudiées. Les données disponibles sur les patients atteints de SEP RR âgés de plus de 55 ans sont limitées. Les patients inscrits aux essais cliniques en cours continuent de prendre 0,92 mg d'ozanimod par jour après avoir atteint 55 ans. La prudence est de mise chez les patients de plus de 55 ans, étant donné le risque accru de réactions indésirables dans cette population, en particulier lorsque le traitement est de longue durée.

## **7 EFFETS INDÉSIRABLES**

### **7.1 Aperçu des effets indésirables**

Les effets indésirables du médicament ont été déterminés d'après les données du programme de développement clinique de l'ozanimod. Dans deux études cliniques sur la SEP contrôlées par traitement actif, 882 patients ont reçu 0,92 mg de ZEPOSIA, pour une exposition globale de 1 323 années-personnes. Les effets indésirables présentés dans le tableau 3 ci-dessous sont basés sur les données d'innocuité provenant de 882 patients traités par ZEPOSIA à 0,92 mg et 885 patients traités par l'IFN  $\beta$ -1a.

Les effets indésirables le plus fréquemment signalés dans les études cliniques de phase III étaient la rhinopharyngite (11 %), l'augmentation de l'alanine aminotransférase (5 %) et l'augmentation de la gamma-glutamyltransférase (5 %).

Les effets indésirables entraînant le plus fréquemment l'arrêt du traitement étaient les augmentations des enzymes hépatiques (1,1 %).

L'incidence globale des effets indésirables graves dans les études de 1 an et 2 ans était de 0,8 % et aucune classe de système organique particulier ne semblait plus touchée que les autres.

### **7.2 Effets indésirables identifiés lors des essais cliniques**

Puisque les essais cliniques sont menés dans des conditions très particulières, les taux d'effets indésirables observés peuvent ne pas refléter les taux observés en pratique et ne doivent pas être comparés aux taux observés dans le cadre des essais cliniques portant sur un autre médicament. Les renseignements sur les effets indésirables d'un médicament tirés d'essais cliniques s'avèrent utiles pour la détermination des effets indésirables liés aux médicaments et pour l'approximation des taux.

Le tableau 3 énumère les effets indésirables apparus pendant le traitement à une fréquence égale ou supérieure à 1 % chez les patients traités par ZEPOSIA et à une fréquence comparable ou supérieure à celle observée avec l'IFN  $\beta$ -1a.

L'effet indésirable le plus fréquent était la rhinopharyngite.

**Tableau 3 Effets indésirables dont l'incidence est supérieure ou égale à 1 % avec ZEPOSIA et dont le taux est égal ou supérieur à celui de l'IFN  $\beta$ -1a**

<b>CLASSE DE SYSTÈME ORGANIQUE TERME PRIVILÉGIÉ<sup>a</sup></b>	<b>ZEPOSIA 0,92 mg n = 882 (%)</b>	<b>IFN <math>\beta</math>-1a 30 <math>\mu</math>g n = 885 (%)</b>
<b>Troubles gastro-intestinaux</b>		
Douleur abdominale haute	20 (2,3)	9 (1,0)
Nausées	15 (1,7)	10 (1,1)
Diarrhée	12 (1,4)	12 (1,4)
<b>Troubles généraux et réactions au point d'administration</b>		
Fatigue	20 (2,3)	16 (1,8)
Asthénie	12 (1,4)	10 (1,1)
<b>Infections et infestations</b>		
Rhinopharyngite	98 (11,1)	84 (9,5)
Infection des voies urinaires <sup>b</sup>	36 (4,1)	27 (3,1)
Pharyngite	28 (3,2)	20 (2,3)
Bronchite	23 (2,6)	17 (1,9)
Infection virale des voies respiratoires	21 (2,4)	11 (1,2)
Rhinite	19 (2,2)	13 (1,5)
Cystite	10 (1,1)	9 (1,0)
<b>Blessure, empoisonnement et complications liées à une intervention</b>		
Contusion	10 (1,1)	7 (0,8)
<b>Examens de laboratoire</b>		
Augmentation des résultats aux examens de la fonction hépatique <sup>c</sup>	93 (10,5)	49 (5,5)
Diminution des résultats aux examens de la fonction pulmonaire <sup>d</sup>	15 (1,7)	7 (0,8)
<b>Troubles du métabolisme et de la nutrition</b>		
Hypercholestérolémie	17 (1,9)	14 (1,6)

CLASSE DE SYSTÈME ORGANIQUE TERME PRIVILÉGIÉ <sup>a</sup>	ZEPOSIA 0,92 mg n = 882 (%)	IFN β-1a 30 µg n = 885 (%)
<b>Troubles de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif</b>		
Maux de dos	35 (4,0)	23 (2,6)
Arthralgie	28 (3,2)	14 (1,6)
<b>Troubles du système nerveux</b>		
Céphalées <sup>e</sup>	82 (9,3)	80 (9,0)
Vertiges	11 (1,2)	7 (0,8)
Étourdissements	10 (1,1)	10 (1,1)
Migraine	9 (1,0)	6 (0,7)
<b>Troubles psychiatriques</b>		
Insomnie	21 (2,4)	20 (2,3)
<b>Troubles vasculaires</b>		
Hypertension <sup>f</sup>	41 (4,6)	21 (2,4)
Hypotension orthostatique	38 (4,3)	28 (3,2)

<sup>a</sup> Les termes privilégiés sont codés selon le dictionnaire MedDRA (version 18.1)

<sup>b</sup> Au moins un de ces effets indésirables a été signalé comme grave

<sup>c</sup> Comprend les termes suivants : augmentation de l'ALT, augmentation de l'AST, augmentation de la GGT, résultat anormal aux épreuves de la fonction hépatique, augmentation de la bilirubine dans le sang, augmentation de la phosphatase alcaline dans le sang, augmentation des enzymes hépatiques, augmentation de la bilirubine conjuguée, augmentation des transaminases

<sup>d</sup> Comprend les termes suivants : diminution de la capacité vitale forcée, diminution de la capacité de diffusion du monoxyde de carbone, diminution du volume expiratoire maximal, spirométrie anormale, résultats anormaux aux épreuves de la fonction pulmonaire, diminution des résultats aux épreuves de la fonction pulmonaire

<sup>e</sup> Comprend les termes suivants : céphalée, céphalée de tension, céphalée vasculaire de Horton

<sup>f</sup> Comprend les termes suivants : hypertension, hypertension orthostatique, hypertension essentielle, crise hypertensive, augmentation de la tension artérielle

## Description de certains effets indésirables survenus en cours de traitement

### Enzymes hépatiques élevées

Lors des essais cliniques sur la SEP contrôlés par traitement actif, des élévations atteignant 3 fois la LSN ou plus sont survenues chez 5,5 % des patients recevant ZEPOSIA et 3,1 % des patients recevant l'IFN β-1a. Le délai médian avant l'élévation 3 fois supérieure à la LSN était de 6 mois. La majorité des patients (79 %) ont poursuivi le traitement par ZEPOSIA, les valeurs revenant à < 3 fois la LSN en deçà de 2 à 4 semaines environ. Des élévations de l'ALT atteignant 5 fois la LSN ou plus sont survenues chez 1,6 % des patients traités par ZEPOSIA à 0,92 mg et 1,3 % des patients recevant l'IFN β-1a. Dans les essais cliniques sur la SEP, ZEPOSIA était arrêté lorsqu'une élévation supérieure à 5 fois la LSN était confirmée.



Globalement, le taux d'abandon en raison d'élévations des enzymes hépatiques a été de 1,1 % chez les patients recevant ZEPOSIA à 0,92 mg et de 0,8 % chez les patients recevant l'IFN  $\beta$ -1a.

### Tension artérielle élevée

Dans les essais cliniques sur la SEP contrôlés par traitement actif, les patients traités par ZEPOSIA ont présenté une augmentation moyenne de la tension systolique d'environ 1 à 2 mm Hg par rapport à l'IFN  $\beta$ -1a, mais on n'a observé aucun effet sur la tension diastolique. L'augmentation de la tension systolique a été détectée pour la première fois environ 3 mois après le début du traitement et a persisté tout au long de ce dernier. Une hypertension (hypertension, hypertension essentielle et tension artérielle élevée) a été signalée comme effet indésirable chez 4,5 % des patients traités par ZEPOSIA à 0,92 mg et 2,3 % des patients sous IFN  $\beta$ -1a.

### Bradycardie

Dans les essais cliniques sur la SEP contrôlés par traitement actif, après l'administration de la dose initiale de 0,23 mg, la réduction moyenne la plus importante de la fréquence cardiaque en position assise/couchée par rapport à la valeur initiale, à savoir 1,2 bpm, est survenue à l'heure 5 du jour 1; la fréquence cardiaque est ensuite remontée près de la valeur initiale à l'heure 6. Une bradycardie a été signalée chez 0,5 % des patients sous ZEPOSIA par rapport à 0 % dans le groupe IFN  $\beta$ -1a le premier jour du traitement. Après le jour 1, l'incidence de la bradycardie s'est établie à 0,8 % avec ZEPOSIA, par rapport à 0,7 % avec l'IFN  $\beta$ -1a. Les patients qui ont présenté une bradycardie étaient généralement asymptomatiques. Aucune fréquence cardiaque inférieure à 40 battements par minute n'a été observée.

Lors des essais cliniques sur la SEP contrôlés par traitement actif avec augmentation graduelle de la dose, les anomalies cliniquement pertinentes dont l'incidence était > 2 % à l'heure 6 du jour 1 dans le groupe traité par l'ozanimod étaient les suivantes : complexes auriculaires prématurés, arythmie sinusale, complexes ventriculaires prématurés, court intervalle PR (aucune onde delta) et bloc auriculoventriculaire du premier degré; aucun bloc auriculoventriculaire du deuxième ou du troisième degré n'a été signalé avec le traitement continu par ZEPOSIA à 0,92 mg.

### Réduction du nombre de lymphocytes dans le sang

3,3 % des patients ont présenté un nombre de lymphocytes inférieur à  $0,2 \times 10^9/L$ , mais les valeurs sont généralement revenues à plus de  $0,2 \times 10^9/L$ , en poursuivant le traitement par ZEPOSIA.

Après l'arrêt de ZEPOSIA à 0,92 mg, le délai médian avant le retour du nombre de lymphocytes du sang périphérique dans l'intervalle normal était de 30 jours, environ 90 % des patients revenant dans l'intervalle normal en deçà de 3 mois.

### Infections

Dans les essais sur la SEP contrôlés par traitement actif, le taux global d'infections était comparable entre les patients traités par ZEPOSIA à 0,92 mg et ceux traités par l'IFN  $\beta$ -1a (35,1 % contre 34,5 %, respectivement). Un zona a été signalé comme effet indésirable chez 0,6 % des patients traités par ZEPOSIA à 0,92 mg et 0,2 % des patients sous IFN  $\beta$ -1a.

### Appareil respiratoire

Des réductions du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) absolu et de la capacité vitale forcée (CVF) dépendantes de la dose ont été observées chez les patients traités par ZEPOSIA (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS – Respiratoire).

### Néoplasmes

Des tumeurs malignes, tels le mélanome, le carcinome basocellulaire, le cancer du sein et le séminome, ont été signalées avec ZEPOSIA dans les essais contrôlés par traitement actif. Un risque accru de tumeurs malignes cutanées a été signalé avec un autre modulateur du récepteur de la S1P.

### Hypersensibilité

Une hypersensibilité, y compris une éruption cutanée et de l'urticaire, a été signalée avec ZEPOSIA dans les essais cliniques sur la SEP contrôlés par traitement actif.

## **7.3 Effets indésirables peu courants identifiés lors des essais cliniques (< 1 %)**

Voici une liste des effets indésirables survenus en cours de traitement qui ont été signalés par les patients traités par ZEPOSIA, toutes doses confondues, dans les essais contrôlés sur la SEP (n = 1 944) et dont l'incidence était < 1 %, quel que soit le groupe de traitement, mais ≥ 0,3 % plus élevée dans le groupe ZEPOSIA par rapport au groupe IFN β-1a ou au groupe placebo. Même si les effets signalés sont survenus pendant le traitement par ZEPOSIA, ils n'étaient pas nécessairement causés par cet agent.

Troubles sanguins et lymphatiques : anémie ferriprive

Troubles cardiaques : palpitations, bloc AV du premier degré, bradycardie sinusale

Troubles endocriniens : thyroïdite auto-immune

Troubles oculaires : douleur oculaire, vision floue, trouble de la rétine, cataracte, blépharospasme, dégénérescence maculaire, atrophie optique

Troubles gastro-intestinaux : gastrite, reflux gastro-œsophagien, dyspepsie, caries dentaires, gastrite chronique, ulcère aphteux

Troubles généraux et réactions au point d'administration : enflure périphérique, gêne thoracique

Troubles hépatobiliaires : hyperbilirubinémie

Troubles du système immunitaire : allergie saisonnière

Infections et infestations : amygdalite, cystite, gastroentérite, infection vaginale, infection virale, trachéite, zona, otite, abcès dentaire, infection virale des voies respiratoires supérieures, conjonctivite, infection vulvovaginale mycosique, appendicite

Blessure, empoisonnement et complications liées à une intervention : lésion articulaire, claquage musculaire

Analyses de laboratoire : prolongation du temps de céphaline activée, gain de poids, augmentation des triglycérides dans le sang

Troubles du métabolisme et de la nutrition : hyperlipidémie, diminution de l'appétit, dyslipidémie

Troubles de l'appareil locomoteur et du tissu conjonctif : faiblesse musculaire, douleur rachidienne,

douleur cervicale, trouble des disques intervertébraux, enflure articulaire

Néoplasmes bénins, malins et non précisés (y compris kystes et polypes) : nævus mélanique, léiomyome utérin, lipome

Troubles du système nerveux : spasticité musculaire, névralgie, céphalée de tension, névralgie du trijumeau

Troubles psychiatriques : trouble d'anxiété

Troubles rénaux et urinaires : incontinence urinaire

Troubles de l'appareil reproducteur et du sein : menstruations irrégulières, kyste ovarien, troubles menstruels, métrorragie, kyste du sein

Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux : douleur oropharyngée, catarrhe, rhinorrhée, épistaxis, dyspnée, congestion nasale, déviation de la cloison nasale, kyste paranasal

Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés : alopecie, prurit, urticaire, dermatite séborrhéique, trouble de la peau, lésion cutanée

Troubles vasculaires : hypotension, phlébite

#### 7.4 Résultats de laboratoire anormaux : hématologie, chimie clinique et autres données quantitatives

**Tableau 4 Résultats de laboratoire anormaux dont l'incidence est supérieure ou égale à 1 % avec ZEPOSIA**

PARAMÈTRE DE LABORATOIRE	ZEPOSIA 0,92 mg n = 882 (%)	IFN β-1a 30 µg n = 885 (%)
<b>Troubles des systèmes sanguin et lymphatique</b>		
Lymphopénie <sup>a</sup>	29 (3,3)	0
<b>Épreuves de laboratoire</b>		
Élévation du taux d'alanine aminotransférase	47 (5,3)	28 (3,2)
Élévation du taux de gamma-glutamyltransférase	40 (4,5)	11 (1,2)
Hypercholestérolémie	17 (1,9)	14 (1,6)
Élévation du taux d'aspartate aminotransférase	16 (1,8)	17 (1,9)
Élévation des taux d'enzymes hépatiques	12 (1,4)	6 (0,7)

<sup>a</sup> Lymphopénie de grade 4

## 8 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

### 8.1 Aperçu

#### Interactions pharmacodynamiques

##### Traitements antinéoplasiques, immunomodulateurs ou immunosuppresseurs

ZEPOSIA n'a pas été étudié en concomitance avec des traitements antinéoplasiques, immunomodulateurs ou immunosuppresseurs. La coadministration de traitements antinéoplasiques, immunomodulateurs ou immunosuppresseurs n'est pas recommandée en raison du risque d'effets immunitaires additifs pendant le traitement et dans les semaines qui suivent l'arrêt de l'un de ces médicaments.

Lors du passage de ZEPOSIA à un autre traitement modificateur de la maladie ayant des effets immunosuppresseurs ou immunomodulateurs, ou vice-versa, la demi-vie et le mode d'action de ZEPOSIA et de l'autre traitement doivent être pris en compte pour éviter les effets immunosuppresseurs additifs non désirés tout en réduisant au minimum le risque de réactivation de la maladie.

Le traitement par ZEPOSIA peut généralement être amorcé immédiatement après l'arrêt de l'interféron bêta ou de l'acétate de glatiramère.

##### Médicaments antiarythmiques et médicaments allongeant l'intervalle QTc

ZEPOSIA n'a pas été étudié chez les patients prenant des médicaments allongeant l'intervalle QTc. Il a été démontré que ZEPOSIA n'allonge pas de manière significative l'intervalle QTc. En raison des effets additifs potentiels des médicaments allongeant l'intervalle QTc qui ont des propriétés arythmogènes connues sur les réductions de la fréquence cardiaque, le traitement par ZEPOSIA ne devrait généralement pas être amorcé chez les patients qui reçoivent simultanément des médicaments antiarythmiques de classe Ia (p. ex. disopyramide, procainamide) ou de classe III (p. ex. amiodarone, sotalol) ou d'autres médicaments allongeant l'intervalle QTc. Les antiarythmiques de classe Ia et de classe III étaient exclus dans les essais cliniques sur le traitement de la sclérose en plaques par ZEPOSIA. Lorsqu'un traitement par ZEPOSIA est envisagé, il faut demander l'avis d'un cardiologue concernant le passage à des médicaments n'allongeant pas l'intervalle QTc ou pour une surveillance appropriée (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire – Recommandations concernant l'instauration du traitement).

Outre les médicaments antiarythmiques de classe Ia et III, les autres médicaments ayant été associés à un allongement de l'intervalle QTc et/ou à des torsades de pointes comprennent, sans s'y limiter, les exemples ci-dessous. Les classes chimiques/pharmacologiques sont incluses dès qu'un de leurs membres, mais pas nécessairement tous, est connu pour avoir provoqué un allongement de l'intervalle QTc et/ou une torsade de pointes : antiarythmiques de classe Ic (p. ex. flécaïnide, propafénone); antipsychotiques (p. ex. chlorpromazine, halopéridol); antidépresseurs (p. ex. fluoxétine, antidépresseurs tricycliques/tétracycliques [p. ex. amitriptyline, imipramine, maprotiline]); opioïdes (p. ex. méthadone); antibiotiques de la classe des macrolides et analogues (p. ex. érythromycine, clarithromycine, tacrolimus); antibiotiques de la classe des quinolones (p. ex. moxifloxacine, ciprofloxacine); antipaludiques (p. ex. quinine, chloroquine); antifongiques azolés (p. ex. kétoconazole); dompéridone; antagonistes des récepteurs 5-HT<sub>3</sub> (p. ex. ondansétron); inhibiteurs de kinases (p. ex. sunitinib); inhibiteurs d'histone-désacétylase (p. ex. vorinostat); agonistes bêta-2 adrénergiques (p. ex. salmétérol).

Les sources d'information actuelles doivent être consultées pour obtenir des listes plus complètes des médicaments allongeant l'intervalle QTc.

### Médicaments ralentissant la fréquence cardiaque

L'effet de la coadministration de ZEPOSIA à la dose d'entretien, de propranolol ou de diltiazem, ou de l'administration avec un bêtabloquant et un inhibiteur des canaux calciques pris ensemble n'a pas été étudié.

ZEPOSIA n'a pas été étudié avec des antiarythmiques de classe Ia ou III, ou d'autres substances susceptibles de diminuer la fréquence cardiaque, y compris, sans s'y limiter, la digoxine, les inhibiteurs de la cholinestérase, la pilocarpine ou l'ivabradine. En raison des effets additifs potentiels sur la réduction de la fréquence cardiaque ou de la conduction cardiaque, ZEPOSIA ne devrait pas être administré aux patients qui reçoivent ces classes de médicaments. Si le traitement par ZEPOSIA est considéré comme nécessaire, il serait approprié de demander l'avis d'un cardiologue concernant le passage à un médicament ne ralentissant pas la fréquence cardiaque ou pour une surveillance appropriée (p. ex. au minimum une surveillance accrue pendant la nuit) au début du traitement si les médicaments ralentissant la fréquence cardiaque ne peuvent pas être interrompus (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire).

### Vaccins

L'administration de vaccins vivants atténués peut comporter un risque d'infection et doit donc être évitée pendant le traitement par ZEPOSIA et jusqu'à 3 mois après l'arrêt de celui-ci (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Immunitaire – Vaccins). Pendant le traitement par ZEPOSIA et jusqu'à trois mois après l'arrêt de ce dernier, les vaccins peuvent être moins efficaces.

### **Interactions pharmacocinétiques**

L'ozanimod est largement métabolisé chez les humains, formant un certain nombre de métabolites actifs circulants, dont deux métabolites actifs majeurs, le CC112273 et le CC1084037, et plusieurs métabolites actifs mineurs, dont le RP101988 et le RP101075 (voir MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, Pharmacocinétique).

### Effet de l'ozanimod sur l'activité de la MAO

En conditions *in vitro*, le CC112273 et le CC1084037 ont inhibé la MAO-B avec une sélectivité plus de 1 000 fois supérieure à celle pour la monoamine oxydase A (MAO-A) (concentration inhibitrice 50 % [CI<sub>50</sub>] > 10 000 nM), avec des CI<sub>50</sub> de 5,72 nM et 58 nM, respectivement. Les concentrations libres du CC112273 et du CC1084037 comptent pour moins de 8 % de ces valeurs de CI<sub>50</sub> *in vitro*.

## **8.2 Interactions médicament-médicament**

### Inhibiteurs de la protéine de résistance du cancer du sein (BCRP)

La coadministration d'inhibiteurs de la BCRP peut augmenter l'exposition aux principaux métabolites actifs CC112273 et CC1084037, ce qui peut accroître le risque d'effets indésirables à ZEPOSIA. Un inhibiteur de la BCRP (cyclosporine) a doublé l'exposition aux métabolites actifs mineurs RP101988 et RP101075 (le précurseur direct du métabolite actif majeur

CC112273). La coadministration d'inhibiteurs de la BCRP (p. ex. cyclosporine, eltrombopag) avec ZEPOSIA n'est pas recommandée.

#### Effet des inhibiteurs puissants du CYP2C8

La coadministration de gemfibrozil (un puissant inhibiteur du CYP2C8) à raison de 600 mg deux fois par jour à l'état d'équilibre et d'une dose unique d'ozanimod de 0,46 mg a augmenté l'exposition (aire sous la courbe [ASC]) aux métabolites actifs CC112273 et CC1084037 d'environ 47 % et 69 %, respectivement. Par conséquent, il n'est pas recommandé de coadministrer ZEPOSIA avec de puissants inhibiteurs du CYP2C8.

#### Effet des inducteurs puissants du CYP2C8

La coadministration de rifampine (un puissant inducteur du CYP2C8) à raison de 600 mg une fois par jour à l'état d'équilibre et d'une dose unique de ZEPOSIA de 0,92 mg a réduit l'exposition (ASC) au CC112273 et au CC1084037 d'environ 60 % et 55 %, respectivement, ce qui pourrait diminuer l'efficacité de ZEPOSIA. Par conséquent, la coadministration de puissants inducteurs du CYP2C8 (p. ex. rifampicine) avec ZEPOSIA n'est pas recommandée.

#### Inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAO)

Les interactions cliniques potentielles avec les inhibiteurs de la MAO n'ont pas été étudiées. Cependant, la coadministration avec des inhibiteurs de la MAO-B peut diminuer l'exposition au principal métabolite actif CC112273 et, en conséquence, à CC1084037. En outre, le CC112273 et le CC1084037 ont inhibé la MAO-B en conditions *in vitro* (CI<sub>50</sub> de 5,72 nM et 58 nM, respectivement) avec une sélectivité plus de 1 000 fois supérieure à celle pour la MAO-A. Par conséquent, l'utilisation concomitante de médicaments appartenant à la classe des inhibiteurs de la MAO (p. ex. sélégiline, phénelzine, rasagiline, safinamide) ou d'autres médicaments qui sont de puissants inhibiteurs de la MAO (y compris l'antibiotique linézolide et le colorant bleu de méthylène) est contre-indiquée en raison de la réduction probable de la concentration des métabolites actifs, entraînant une réduction de l'effet thérapeutique et un risque d'inhibition non sélective de la MAO, qui peut provoquer une crise hypertensive (voir CONTRE-INDICATIONS; MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire).

Il doit s'écouler au moins 3 mois entre l'arrêt de ZEPOSIA et le début du traitement par les inhibiteurs de la MAO.

#### Tyramine

Dans le tractus gastro-intestinal et le foie, la MOA (principalement de type A) offre une protection contre les amines exogènes (p. ex. tyramine). Si la tyramine était absorbée sous forme intacte, elle pourrait entraîner une hypertension grave, y compris une crise hypertensive. Les aliments vieillis, fermentés, salés, fumés et marinés contenant de grandes quantités d'amines exogènes (p. ex. fromage vieilli, hareng mariné) peuvent provoquer la libération de norépinéphrine entraînant une augmentation de la tension artérielle (réaction à la tyramine). Il faudrait conseiller aux patients d'éviter les aliments contenant une grande quantité de tyramine lorsqu'ils prennent ZEPOSIA aux doses recommandées.

#### Agents adrénergiques et sérotoninergiques

##### *Médicaments opioïdes et sérotoninergiques*

Des réactions graves, parfois mortelles, y compris une toxicité sérotoninergique (également appelée syndrome sérotoninergique) ont été précipitées par l'utilisation concomitante

d'inhibiteurs de la MAO (y compris les inhibiteurs sélectifs de la MAO-B) et de médicaments opioïdes (p. ex. mépéridine et ses dérivés, méthadone, propoxyphène, tramadol ou tapentadol) et/ou de médicaments agissant sur la sérotonine. Dans les essais cliniques, un petit nombre de patients traités par ZEPOSIA ont été exposés de façon concomitante à des médicaments opioïdes et/ou sérotoninergiques sans présenter de syndrome/toxicité sérotoninergique. Toutefois, cette exposition n'était pas suffisante pour exclure la possibilité d'un effet indésirable résultant de la coadministration. Par conséquent, la coadministration de ZEPOSIA avec des médicaments opioïdes et/ou sérotoninergiques, y compris des inhibiteurs du recaptage de la sérotonine-norépinéphrine (IRSN), des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS), des antidépresseurs tricycliques, tétracycliques ou triazolopyridiniques, la cyclobenzapriline ou le millepertuis, n'est pas recommandée. Lorsqu'un traitement concomitant par ZEPOSIA et des médicaments opioïdes ou sérotoninergiques est cliniquement nécessaire, une observation étroite du patient est conseillée, en particulier au début du traitement et lors des augmentations de la dose.

#### *Médicaments sympathomimétiques*

Une étude croisée contrôlée par placebo a été menée pour évaluer le potentiel de ZEPOSIA à améliorer les réponses vasopressives à la pseudoéphédrine chez des sujets sains. La coadministration de ZEPOSIA et de pseudoéphédrine n'a pas potentialisé l'effet de la pseudoéphédrine sur la tension artérielle. ZEPOSIA a augmenté la fréquence cardiaque induite par la pseudoéphédrine d'environ 3 bpm. Toutefois, une crise hypertensive est survenue avec l'administration de ZEPOSIA à 0,92 mg seul et une crise hypertensive a été signalée lors de la coadministration d'autres inhibiteurs sélectifs et non sélectifs de la MAO (p. ex. la rasagiline) avec des médicaments sympathomimétiques (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire).

### **8.3 Interactions médicament-aliment**

La consommation d'aliments (repas riches et pauvres en graisses) n'a eu aucun effet sur l'exposition à l'ozanimod (concentration plasmatique maximale [ $C_{max}$ ] et ASC).

### **8.4 Interactions médicament-plante médicinale**

Les interactions avec les produits à base de plantes médicinales n'ont pas été étudiées.

### **8.5 Interactions médicament-épreuves de laboratoire**

Les interactions avec les épreuves de laboratoire n'ont pas été étudiées.

## **9 MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE**

### **9.1 Mode d'action**

L'ozanimod est un modulateur du récepteur de la sphingosine 1-phosphate (S1P). Chez les humains, environ 94 % de l'exposition totale au médicament actif en circulation est attribuable à l'ozanimod (6 %) et à ses deux principaux métabolites actifs, le CC112273 (73 %) et le CC1084037 (15 %), qui se lient tous aux sous-types S1P1 et S1P5 avec une grande affinité. La liaison de l'ozanimod et de ses métabolites aux récepteurs S1P1 sur les lymphocytes empêche la sortie des lymphocytes des ganglions lymphatiques, réduisant ainsi le nombre de lymphocytes dans le sang périphérique. Le mécanisme par lequel l'ozanimod et ses métabolites actifs exercent leurs effets thérapeutiques dans la sclérose en plaques n'est pas connu, mais il

pourrait comprendre une réduction de la migration des lymphocytes dans le système nerveux central.

## 9.2 Pharmacodynamie

### Système immunitaire

Réduction du nombre de lymphocytes dans le sang

Dans les essais cliniques sur la SEP contrôlés par traitement actif, le nombre moyen de lymphocytes a diminué à environ 43-47 % des valeurs initiales après 3 mois (nombre moyen approximatif de lymphocytes dans le sang :  $0,8 \times 10^9/L$ ) et est resté stable pendant le traitement par ZEPOSIA.

Après l'arrêt de ZEPOSIA à 0,92 mg, le délai médian avant le retour du nombre de lymphocytes du sang périphérique dans l'intervalle normal était de 30 jours, environ 90 % des patients revenant dans l'intervalle normal en deçà de 3 mois.

### Réduction de la fréquence cardiaque

L'ozanimod peut entraîner une réduction transitoire de la fréquence cardiaque au début du traitement (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cardiovasculaire). Un schéma à dose croissante avec une dose initiale de ZEPOSIA de 0,23 mg, suivie de doses de 0,46 mg et de 0,92 mg, atténue l'ampleur des réductions de la fréquence cardiaque (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION).

### Électrophysiologie cardiaque

Une étude approfondie sur l'intervalle QT, à double insu, à répartition aléatoire, contrôlée par témoin positif et placebo et avec groupes parallèles, utilisant un schéma à dose croissante sur 14 jours, de 0,23 mg une fois par jour (f.p.j.) les jours 1 à 4, 0,46 mg 1 f.p.j. les jours 5 à 7, 0,92 mg 1 f.p.j. (dose thérapeutique cible) les jours 8 à 10 et 1,84 mg 1 f.p.j. (dose suprathérapeutique) les jours 11 à 14 et menée chez des sujets en bonne santé (62 par groupe), n'a révélé aucune preuve d'un effet cliniquement pertinent sur l'intervalle QTcF. La durée du traitement dans cette étude n'était pas suffisante pour que les principaux métabolites, le CC112273 et le CC1084037, atteignent des concentrations plasmatiques à l'état d'équilibre.

## 9.3 Pharmacocinétique

L'ozanimod est largement métabolisé chez les humains, formant un certain nombre de métabolites actifs circulants, dont deux métabolites actifs majeurs, le CC112273 et le CC1084037, ayant une activité et une affinité sélective pour S1P1 et S1P5 comparables à celles de la molécule mère. La concentration plasmatique maximale ( $C_{max}$ ) et l'aire sous la courbe (ASC) de l'ozanimod, du CC112273 et du CC1084037 ont augmenté de manière proportionnelle dans l'intervalle posologique de ZEPOSIA de 0,46 mg à 0,92 mg (de 0,5 à 1 fois la dose recommandée). Après l'administration de doses multiples, environ 94 % de l'exposition totale au médicament actif en circulation est attribuable à l'ozanimod (6 %), au CC112273 (73 %) et au CC1084037 (15 %). À une dose de 0,92 mg par voie orale une fois par jour chez les patients atteints de SEP RR, la moyenne géométrique (coefficient de variation [CV %]) de la  $C_{max}$  et de l'ASC<sub>0-24h</sub> à l'état d'équilibre était de 231,6 pg/mL (37,2 %) et 4 223 pg\*h/mL (37,7 %), respectivement, pour l'ozanimod, et de 6 378 pg/mL (48,4 %) et 132 861 pg\*h/mL (45,6 %), respectivement, pour le CC112273. La  $C_{max}$  et l'ASC<sub>0-24h</sub> pour le CC1084037 représentent environ 20 % des valeurs pour le CC112273. Les facteurs affectant le CC112273 s'appliquent au CC1084037, car il s'agit de métabolites qui s'interconvertissent.



**Tableau 5 Paramètres pharmacocinétiques moyens (écart-type [ÉT]) de l'ozanimod et de son métabolite actif prédominant, le CC112273, chez les patients atteints de SEP RR après l'administration orale de ZEPOSIA à 0,92 mg une fois par jour pendant 12 semaines**

Analyte	C <sub>max</sub> (pg/mL)	T <sub>max</sub> (h) <sup>a</sup>	C <sub>min</sub> (pg/mL)	ASC <sub>T</sub> (pg*h/mL)
Ozanimod	244 (77,6)	7,92 (4,00, 10,0)	111 (48,2)	4 460 (1 419)
CC112273	6 977 (2 978)	6,00 (0,00, 24,0)	4 617 (2 234)	143 765 (56 290)

<sup>a</sup> Le T<sub>max</sub> est exprimé sous forme de médiane (minimum – maximum)

**Absorption :** Le T<sub>max</sub> de l'ozanimod et des principaux métabolites actifs, le CC112273 et le CC1084037, était d'environ 6 à 8 heures, 10 heures et 16 heures, respectivement. L'absorption chez les humains semble être élevée, selon la grande perméabilité de l'ozanimod et la faible quantité de radioactivité totale (0,06 % de la dose) ou d'ozanimod intact récupérée dans les fèces au cours des 24 heures suivant l'administration d'une dose unique d'ozanimod radiomarqué.

Effet des aliments :

L'administration de l'ozanimod avec un repas riche en graisses et en calories (environ 900 à 1 100 calories dont 150, 250 à 360, et 500 à 600 calories provenant respectivement des protéines, des glucides et des graisses) n'a eu aucun effet sur l'exposition à l'ozanimod (C<sub>max</sub> et ASC).

**Distribution :** Le volume apparent moyen (CV %) de distribution de l'ozanimod (V<sub>z</sub>/F) était de 5 590 L (27 %), ce qui indique une distribution tissulaire étendue. La proportion d'ozanimod lié aux protéines plasmatiques humaines est d'environ 98,2 %. Le CC112273 et le CC1084037 se lient aux protéines plasmatiques humaines dans une proportion d'environ 99,8 % et 99,3 %, respectivement.

**Métabolisme :** L'ozanimod est métabolisé par de multiples enzymes, formant des métabolites actifs majeurs (CC112273 et CC1084037) et mineurs (RP101988, RP101075 et RP101509) en circulation, dont l'activité et l'affinité sélective pour les récepteurs S1P1 et S1P5 sont similaires. La voie oxydative menant à la formation du métabolite carboxylate RP101988 est médiée par l'aldéhyde déshydrogénase (ALDH)/alcool déshydrogénase (ADH) tandis que la formation du RP101075 par désalkylation est principalement assurée par le CYP3A4. Le RP101075 est soit N-acétylé par la N-acétyltransférase-2 (NAT-2) pour former le RP101442, soit désaminé par la MAO-B pour former le métabolite principal CC112273.

Le CC112273 est soit réduit pour former le CC1084037, soit soumis à une oxydation médiée par le CYP2C8 pour former le RP101509. Le CC1084037 est oxydé rapidement pour former le CC112273 par l'intermédiaire de l'aldo-kéto réductase (AKR) 1C1/1C2 et/ou des 3β- et 11β-hydroxystéroïde déshydrogénases (HSD) et est métabolisé de façon réversible en CC112273. L'interconversion oxydo-réductive entre le CC112273 et le CC1084037 favorise le CC112273 et il n'y a pas de métabolite direct du CC1084037 autre que son métabolisme en CC112273 et son élimination subséquente par cette voie. Environ 94 % de l'exposition totale au médicament actif en circulation est attribuable à l'ozanimod (6 %), au CC112273 (73 %) et au CC1084037 (15 %) chez les humains.

**Élimination** : La clairance orale apparente moyenne (CV %) pour l'ozanimod était d'environ 192 L/h (37 %). La demi-vie plasmatique moyenne (CV %) ( $t_{1/2}$ ) de l'ozanimod était d'environ 21 heures (15 %). L'état d'équilibre pour l'ozanimod a été atteint en deçà de 7 jours, avec un coefficient d'accumulation estimé, avoisinant 2 suivant une administration orale répétée de 0,92 mg une fois par jour.

La demi-vie efficace modélisée moyenne (CV %) ( $t_{1/2}$ ) du CC112273 était d'environ 11 jours (104 %) chez les patients atteints de SEP RR, avec un délai moyen (CV %) avant l'état d'équilibre d'environ 45 jours (45 %) et un coefficient d'accumulation d'environ 16 (101 %). Les concentrations plasmatiques du CC112273 et de son métabolite interconvertissant direct, le CC1084037, ont diminué de façon parallèle durant la phase terminale, produisant un  $t_{1/2}$  similaire pour les deux métabolites. Le délai d'atteinte de l'état d'équilibre et le coefficient d'accumulation pour le CC1084037 devraient être similaires à ceux du CC112273.

Après une dose orale unique de 0,92 mg de [ $^{14}$ C]-ozanimod, environ 26 % et 37 % de la radioactivité a été récupérée dans les urines et les fèces, respectivement, provenant principalement de métabolites inactifs. Les concentrations de l'ozanimod, du CC112273 et du CC1084037 dans l'urine étaient négligeables.

### **Populations et états pathologiques particuliers**

**Enfants** : Aucune donnée n'est disponible sur l'administration de ZEPOSIA aux enfants ou aux adolescents (< 18 ans).

**Personnes âgées** : Aucune donnée pharmacocinétique n'est disponible sur l'administration de ZEPOSIA aux patients âgés de 65 ans et plus. L'innocuité et l'efficacité de ZEPOSIA chez les patients âgés de 55 ans et plus n'ont pas été établies.

**Sexe** : Bien que la pharmacocinétique de population de l'ozanimod ne soit pas modifiée par le sexe, l'exposition à l'état d'équilibre (ASC) au CC112273 était environ 35 % plus faible chez les hommes que chez les femmes.

**Origine ethnique** : Dans une étude pharmacocinétique japonaise de transition, après l'administration répétée de ZEPOSIA à 0,92 mg, l'exposition à l'ozanimod ( $C_{max}$  et  $ASC_{tau}$ ) est restée inchangée et l'exposition au CC112273 ( $C_{max}$  et  $ASC_{tau}$ ) a augmenté d'environ 28 % et 43 %, respectivement, chez les sujets japonais (N = 10) par rapport aux sujets de race blanche (N = 12).

**Insuffisance rénale** : Dans un essai consacré à l'insuffisance rénale, après l'administration d'une dose orale unique de 0,23 mg de ZEPOSIA, l'exposition ( $ASC_{finale}$ ) à l'ozanimod et au CC112273 a été respectivement supérieure de 27 % et inférieure de 23 %, environ, chez les sujets atteints d'insuffisance rénale terminale (N = 8) par rapport aux sujets présentant une fonction rénale normale (N = 8).

Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients atteints d'insuffisance rénale (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION).

**Fumeurs** : Les résultats de la pharmacocinétique de population ont montré que l'exposition à l'état d'équilibre (ASC) au CC112273 était environ 50 % plus faible chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Les répercussions cliniques du tabagisme sur le traitement par l'ozanimod chez les patients atteints de SEP RR ne sont pas connues.

## **10 ENTREPOSAGE, STABILITÉ ET TRAITEMENT**

Conserver entre 15 °C et 25 °C. Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

## PARTIE II : RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES

### 11 RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES


#### Substance pharmaceutique

Dénomination commune : chlorhydrate d'ozanimod

Nom chimique : 5-(3-((1S)-1-[(2-hydroxyéthyl)amino]-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)-2-[(propan-2-yl)oxy]benzonitrile, monohydrochlorure

Formule et masse moléculaires : C<sub>23</sub>H<sub>24</sub>N<sub>4</sub>O<sub>3</sub>•HCl; 440,92

Formule de structure :



Propriétés physicochimiques : L'ozanimod est une poudre blanche à blanc cassé avec une valeur de pKa de 7,90. L'ozanimod présente une solubilité dépendant du pH dans les milieux aqueux dans tout l'intervalle des pH physiologiques. Le point de fusion est de 240 °C.

### 12 ESSAIS CLINIQUES

#### 12.1 Conception de l'essai et aspects démographiques de l'étude

**Tableau 6 Résumé des données démographiques des patients dans les essais cliniques pivots sur la sclérose en plaques récurrente-rémittente**

N° de l'étude	Méthodologie de l'essai	Posologie, voie d'administration et durée	Nombre de sujets (n)	Âge moyen (intervalle)	Sexe
SUNBEAM (RPC01-301)	Étude à répartition aléatoire, à double insu, à double placebo, contrôlée par traitement actif et avec groupes parallèles	Dose orale	ozanimod	34,8 ans (18 – 55)	Femmes = 63 %
		uniquotidienne d'ozanimod à 0,92 mg ou à 0,46 mg, ou IFN β-1a à 30 µg par injection intramusculaire (IM) hebdomadaire pendant 12 mois et plus <sup>a</sup>	à 0,92 mg (N = 447)	36,0 ans (18 – 55)	Femmes = 69 %
			ozanimod à 0,46 mg (N = 451)	35,9 ans (18 – 55)	Femmes = 67 %
			IFN β-1a à 30 µg IM (N = 448)		

N° de l'étude	Méthodologie de l'essai	Posologie, voie d'administration et durée	Nombre de sujets (n)	Âge moyen (intervalle)	Sexe
RADIANCE (RPC01-201B)	Étude à répartition aléatoire, à double insu, à double placebo, contrôlée par traitement actif et avec groupes parallèles	Dose orale unique quotidienne d'ozanimod à 0,92 mg ou à 0,46 mg, ou IFN β-1a à 30 µg par injection IM hebdomadaire pendant 24 mois	ozanimod à 0,92 mg (N = 433)	36,0 ans (18 – 55)	Femmes = 67 %
			ozanimod à 0,46 mg (N = 439)	35,4 ans (18 – 55)	Femmes = 65 %
			IFN β-1a à 30 µg IM (N = 441)	35,1 ans (18 – 55)	Femmes = 69 %

<sup>a</sup> Le traitement a été poursuivi jusqu'à ce que tous les sujets aient reçu le produit expérimental pendant au moins 12 mois.

ZEPOSIA a été évalué dans le cadre de deux essais cliniques à répartition aléatoire, à double insu, à double placebo, avec groupes parallèles et contrôlés par traitement actif, ayant une méthodologie et des critères d'évaluation similaires et menés chez des patients atteints de SEP RR traités pendant au moins 1 an (SUNBEAM – traitement poursuivi chez tous les patients jusqu'à ce que le dernier patient inscrit ait franchi 1 an de participation) et 2 ans (RADIANCE).

La dose de ZEPOSIA était de 0,92 mg et 0,46 mg administrée par voie orale une fois par jour, avec une dose initiale de 0,23 mg les jours 1 à 4, suivie d'une dose de 0,46 mg les jours 5 à 7, puis de la dose attribuée pour le jour 8 et les jours suivants. La dose d'IFN β-1a, le comparateur actif, était de 30 µg par voie intramusculaire une fois par semaine. Les deux études comprenaient des patients qui avaient subi au moins une poussée au cours de l'année précédente, ou une poussée au cours des deux années précédentes avec signes d'au moins une lésion rehaussée par le gadolinium (RGd) au cours de l'année précédente et un score à l'échelle EDSS (Expanded Disability Status Scale) de 0 à 5,0. Des évaluations neurologiques ont été effectuées avant le début du traitement, puis tous les 3 mois et au moment d'une poussée présumée. Des examens d'IRM ont été effectués avant le début du traitement (SUNBEAM et RADIANCE), à 6 mois (SUNBEAM), à 1 an (SUNBEAM et RADIANCE) et à 2 ans (RADIANCE).

Le principal critère d'évaluation des études SUNBEAM et RADIANCE était le taux annualisé de poussées (TAP) sur 12 mois pour l'étude SUNBEAM et sur 24 mois pour l'étude RADIANCE. Les principaux critères d'évaluation secondaire incluaient : 1) nombre de lésions cérébrales en hypersignal en T2 nouvelles ou élargies sur 12 mois et 24 mois; 2) nombre de lésions IRM RGd en T1 à 12 mois et 24 mois; et 3) délai avant la progression confirmée de l'incapacité, définie comme une augmentation d'au moins 1 point par rapport au score EDSS initial s'étant maintenue pendant 12 semaines. La progression confirmée de l'incapacité a été évaluée de manière prospective dans une analyse groupée des études SUNBEAM et RADIANCE. Un autre critère d'évaluation à l'IRM était le pourcentage moyen de variation du volume cérébral normalisé par rapport au départ.

Dans l'étude SUNBEAM, 1 346 patients ont été répartis aléatoirement pour recevoir ZEPOSIA à 0,92 mg (n = 447), ZEPOSIA à 0,46 mg (n = 451) ou l'IFN β-1a (n = 448); 94 % des patients traités par ZEPOSIA à 0,92 mg, 94 % des patients traités par ZEPOSIA à 0,46 mg et 92 % des patients traités par l'IFN β-1a ont terminé l'étude. L'âge moyen (médian) était de 35,6 (35) ans, 66 % des sujets étaient des femmes, le temps écoulé moyen (médian) depuis l'apparition des symptômes de la SEP était de 7 (5,2) ans et le temps écoulé moyen (ÉT) depuis le diagnostic

de SEP était de 3,7 (4,4) ans. Le score EDSS moyen (médian) au départ était de 2,62 (2,5); 70 % des sujets n'avaient jamais reçu de traitement modificateur de la maladie. Au départ, le nombre moyen de poussées au cours de l'année précédente était de 1,3 et 47 % des patients présentaient une ou plusieurs lésions RGd en T1 (moyenne de 1,7).

La durée médiane du traitement a été de 13,6 mois.

Dans l'étude RADIANCE, 1 313 patients ont été répartis aléatoirement pour recevoir ZEPOSIA à 0,92 mg (n = 433), ZEPOSIA à 0,46 mg (n = 439) ou l'IFN β-1a (n = 441); 90 % des patients traités par ZEPOSIA à 0,92 mg, 85 % des patients traités par ZEPOSIA à 0,46 mg et 85 % des patients traités par l'IFN β-1a ont terminé l'étude. L'âge moyen (médian) était de 35,5 (35) ans, 67 % des sujets étaient des femmes, le temps écoulé moyen (médian) depuis l'apparition des symptômes de la SEP était de 6,5 (4,8) ans et le temps écoulé moyen (ÉT) depuis le diagnostic de SEP était de 3,7 (4,7) ans. Le score EDSS moyen (médian) au départ était de 2,51 (2,5); 71 % des sujets n'avaient jamais reçu de traitement modificateur de la maladie. Au départ, le nombre moyen de poussées au cours de l'année précédente était de 1,3 et 43 % des patients présentaient une ou plusieurs lésions RGd en T1 (moyenne de 1,7).

La durée médiane du traitement a été de 24 mois.

## 12.2 Résultats des études

Le TAP a été significativement plus faible chez les patients traités par l'ozanimod à 0,92 mg que chez les patients qui ont reçu l'IFN β-1a à 30 µg par injection IM. Le nombre de lésions nouvelles ou élargies en T2 et le nombre de lésions RGd ont été significativement plus faibles chez les patients traités par ZEPOSIA que chez les patients qui ont reçu l'IFN β-1a.

Il n'y a pas eu de différence statistiquement significative dans la progression de l'incapacité confirmée sur trois mois et six mois entre les patients traités par ZEPOSIA et ceux traités par l'IFN bêta-1a pendant deux ans.

Les résultats des études SUNBEAM et RADIANCE sont présentés au Tableau 7.

**Tableau 7 Principaux critères d'évaluation cliniques et à l'IRM chez les patients atteints de SEP RR dans les études SUNBEAM et RADIANCE**

Critères d'évaluation	SUNBEAM (≥ 1 an)		RADIANCE (2 ans)	
	ZEPOSIA 0.92 mg (n = 447) %	IFN β-1a 30 µg (n = 448) %	ZEPOSIA 0.92 mg (n = 433) %	IFN β-1a 30 µg (n = 441) %
<b>Critères d'évaluation cliniques</b>				
<b>Taux annualisé de poussées (principal critère d'évaluation)</b>	0,181	0,350	0,172	0,276
<b>Réduction relative</b>	48 % ( $p < 0,0001$ )		38 % ( $p < 0,0001$ )	
<b>Proportion sans poussée Estimation de Kaplan-Meier</b>	78 % 0,781 ( $p = 0,0002$ ) <sup>1</sup>	66 % 0,663	76 % 0,756 ( $p = 0,0012$ ) <sup>1</sup>	64 % 0,642

Critères d'évaluation	SUNBEAM (≥ 1 an)		RADIANCE (2 ans)	
	ZEPOSIA 0,92 mg (n = 447) %	IFN β-1a 30 µg (n = 448) %	ZEPOSIA 0,92 mg (n = 433) %	IFN β-1a 30 µg (n = 441) %
Proportion de patients présentant une progression de l'incapacité confirmée sur 3 mois <sup>2</sup> Rapport des risques instantanés	7,6 % (ZEPOSIA) p/r à 7,8 % (IFN β-1a)  0,95 p = 0,7651			
Réduction du risque relatif (analyse regroupée <sup>2</sup> )	5 %; p = N.S. <sup>3</sup>			
<b>Critères d'évaluation à l'IRM</b>				
Nombre moyen de lésions en hypersignal en T2 nouvelles ou élargies par IRM <sup>4</sup> Réduction relative	1,465	2,836	1,835	3,183
	48 % (p < 0,0001)		42 % (p < 0,0001)	
Nombre moyen de lésions RGd en T1 <sup>5</sup> Réduction relative	0,160	0,433	0,176	0,373
	63 % (p < 0,0001)		53 % (p = 0,0006)	

<sup>1</sup> Test logarithmique par rangs

<sup>2</sup> Analyse groupée des études SUNBEAM et RADIANCE planifiée de façon prospective

<sup>3</sup> N.S. = non significatif

<sup>4</sup> Pendant la période de traitement

<sup>5</sup> À la fin de la période de traitement pour chaque étude

Dans l'étude SUNBEAM à 12 mois et dans l'étude RADIANCE à 24 mois, le traitement par l'ozanimod à 0,92 mg a entraîné une réduction du pourcentage moyen de variation du volume normalisé du cerveau entier par rapport à la valeur initiale, comparativement à l'IFN β-1a par injection IM (0,41 % contre -0,61 %, et 0,71 % contre -0,94 %, respectivement; valeur de p nominale < 0,0001 pour les deux études).

### 13 TOXICOLOGIE NON CLINIQUE

#### Toxicologie générale

Dans les études de toxicologie générale à doses répétées chez le rat et le singe, l'administration orale d'ozanimod a entraîné une lymphopénie, une diminution des lymphocytes dans le thymus cortical et une diminution des lymphocytes dans la zone marginale de la rate. Ces résultats correspondent aux effets attendus des agonistes des récepteurs S1P1. L'ozanimod a également augmenté le poids des poumons et l'incidence d'infiltrats alvéolaires de mononucléaires aux doses moyenne et élevée dans les études sur le rat et le singe. La dose sans effet nocif dans l'étude de 39 semaines chez le singe était de 0,1 mg/kg/jour, dose pour laquelle l'exposition générale à l'ozanimod était 3,7 fois supérieure par rapport à la dose maximale recommandée chez l'humain (DMRH), tandis que l'exposition aux principaux métabolites humains était sous-thérapeutique. Les changements pulmonaires n'ont été associés à aucun signe clinique observable chez le rat ou le singe, ne se sont pas aggravés

avec une administration prolongée et étaient réversibles. Outre la lymphopénie, l'ozanimod a eu un effet inhibiteur sur les réponses des anticorps IgG et IgM dépendants des cellules T chez le rat. Aucune phototoxicité potentielle *in vitro* n'a été observée avec l'ozanimod ou ses métabolites.

### **Carcinogénicité**

La carcinogénicité de l'ozanimod administré par voie orale a été évaluée dans un essai biologique de 6 mois sur des souris Tg.rasH2 (8, 25 et 80 mg/kg/jour) et un essai biologique de deux ans sur des rats. Dans l'étude de 6 mois sur les souris Tg.rasH2, une augmentation statistiquement significative de l'incidence des hémangiosarcomes a été observée chez les mâles à toutes les doses et chez les femelles à la dose moyenne et élevée dans plusieurs organes. À la dose de 8 mg/kg/jour, l'exposition générale était environ 1 680 fois, 106 fois et 97 fois plus élevée que celle observée avec la DMRH de l'ozanimod, son principal métabolite inactif chez l'humain et les agonistes des récepteurs S1P1 combinés (ozanimod plus ses principaux métabolites actifs chez les humains), respectivement.

Sur la base des données publiées, on a postulé que les hémangiosarcomes induits par le siponimod (un médicament pharmacologiquement similaire) chez la souris résultent d'une stimulation chronique des cellules endothéliales par l'intermédiaire des récepteurs S1P1 (également connus sous le nom de récepteurs du gène de différenciation endothéliale [EDG pour Endothelial Differentiation Gene] 1), donnant lieu à une production soutenue de facteur de croissance placentaire 2 (PIGF2 pour Placental Growth Factor 2) et, par conséquent, à des mitoses persistantes des cellules endothéliales vasculaires. Ce récepteur est abondant sur les cellules endothéliales vasculaires et est important pour la migration, la différenciation et la survie des cellules endothéliales. En revanche, les cellules endothéliales vasculaires du rat et de l'humain n'ont pas libéré de PIGF2, ou ne l'ont fait que de façon transitoire, en réponse au siponimod, après quoi aucune stimulation soutenue ou formation d'hémangiosarcomes n'a été observée chez le rat. On ne sait pas si les mêmes phénomènes se produisent après l'administration de l'ozanimod.

Dans l'essai biologique de deux ans sur le rat, aucune augmentation de l'incidence des différents types de tumeur n'a été observée avec des doses d'ozanimod allant jusqu'à 2 mg/kg/jour, avec lesquelles l'exposition générale correspondait à 126 fois, 212 fois et 7,6 fois celle de la DMRH pour l'ozanimod, son principal métabolite inactif chez les humains et les agonistes du récepteur de la S1P combinés (ozanimod plus ses principaux métabolites actifs), respectivement.

### **Génotoxicité**

L'ozanimod et les multiples métabolites ont donné des résultats négatifs aux tests de mutagénicité bactérienne. Les tests de génotoxicité *in vitro* sur les mammifères ont montré que l'ozanimod et le CC112273 n'étaient pas génotoxiques alors que le CC1084037 s'est avéré clastogène. Cependant, le CC1084037 administré par gavage oral une fois par jour à des rats à des doses allant jusqu'à 1000 mg/kg/jour s'est révélé négatif pour l'induction d'érythrocytes polychromatiques micronucléés et négatif pour l'induction de dommages à l'ADN dans le foie des rats mâles et femelles. Après l'administration orale chez le rat, l'ozanimod s'est avéré négatif pour l'induction d'érythrocytes polychromatiques micronucléés. Globalement, l'ozanimod et ses métabolites ne montrent aucun potentiel génotoxique en conditions *in vitro* ou *in vivo*.

### **Toxicologie de la reproduction et du développement**

L'administration orale d'ozanimod à des doses de 0,2, 2 et 30 mg/kg/jour à des rats mâles et femelles avant et pendant la période d'accouplement et jusqu'au jour 7 de la gestation (JG)



(chez les femelles) ou la nécropsie (chez les mâles après 7 semaines d'administration) n'a eu aucun effet sur l'accouplement, la fertilité et les indices de reproduction (qualité du sperme et données sur les césariennes). La dose sans effet observé (DSEO) de l'ozanimod pour la fonction gonadique, les comportements d'accouplement, la performance reproductive et les effets en début de gestation chez le rat était donc de 30 mg/kg/jour. À cette dose, l'exposition générale estimée au médicament actif et à ses métabolites combinés (ozanimod, CC112273 et CC1084037) est environ 150 fois supérieure à celle observée avec la DMRH.

Il a été démontré que la voie de signalisation de la sphingosine 1-phosphate régule les événements cruciaux de l'embryogenèse, tels que l'angiogenèse, la cardiogenèse, la croissance des membres et la neurogenèse, tandis que le récepteur de la sphingosine 1-phosphate est connu pour jouer un rôle dans la formation des vaisseaux pendant l'embryogenèse. Les effets indésirables de l'ozanimod sur le développement embryofœtal chez le rat et le lapin, ou du moins les anomalies vasculaires, semblent liés à la pharmacologie de l'ozanimod et de ses métabolites pharmacologiquement actifs. Chez les rats, l'ozanimod à 0,2, 1 et 5 mg/kg/jour administré par gavage oral pendant l'organogenèse a été bien toléré par les mères, entraînant seulement de légers effets sur le gain de poids corporel maternel et la consommation alimentaire à la dose élevée. À la dose de 5 mg/kg/jour, on a constaté une embryotoxicité évidente avec une forte incidence de mort embryonnaire et fœtale, une légère réduction du poids fœtal moyen, une ossification retardée et des malformations chez trois fœtus présentant une anasarque et deux autres ayant des testicules mal positionnés. La dose sans effet nocif observé (DSENO) pour la toxicité embryofœtale chez le rat est de 1 mg/kg/jour, dose qui est associée à une exposition générale au médicament actif et à ses métabolites combinés (ozanimod, CC112273 et CC1084037) 3,5 fois plus élevée que celle associée à la DMRH. Chez les lapines gravides, l'ozanimod à 0,2 et 0,6 mg/kg/jour a été bien toléré, mais la dose de 2 mg/kg/jour a entraîné un avortement. La dose de 2 mg/kg/jour a entraîné une augmentation de l'incidence de mortalité embryofœtale, un seul avortement, une ossification anormale et retardée et une malformation des gros vaisseaux sanguins ou une absence du tronc artériel brachiocéphalique chez huit fœtus, et bien qu'il n'y ait eu aucun effet sur la survie embryofœtale avec la dose de 0,6 mg/kg/jour, on a tout de même observé des changements morphologiques viscéraux et squelettiques similaires à ceux observés avec la dose élevée. La DSENO pour la toxicité embryofœtale était de 0,2 mg/kg/jour. L'exposition au médicament actif et à ses métabolites combinés (ozanimod, CC112273 et CC1084037) chez le lapin était sous-thérapeutique par rapport à l'exposition associée à la DMRH. Les données sur le CC112273 et le CC1084037 provenaient d'études pharmacocinétiques de transition.

Dans une étude sur la toxicité sur le développement pré- et postnatal, des rates gravides (génération F0) ont reçu l'ozanimod par gavage oral à raison de 0,2, 0,7 et 2 mg/kg/jour du JG 6 à la mise bas et à la lactation (jusqu'au jour 20 de la lactation). L'ozanimod à des doses allant jusqu'à 2 mg/kg/jour a été bien toléré par les mères. L'administration d'ozanimod aux mères F0 à raison de 2,0 mg/kg/jour a entraîné les effets suivants chez la progéniture F1 : diminution du poids corporel chez les mâles et les femelles (de 5 à 7 % inférieur à celui du groupe témoin) pendant la lactation et après le sevrage, augmentation de l'activité motrice et allongement du cycle œstral chez les femelles F1 (5,2 jours contre 4,2 jours chez le groupe témoin). En raison des variations de pourcentage < 10 %, ou de l'absence de réponse à la dose, ou d'autres effets corrélatifs, tous ces effets ont été considérés comme non nocifs. Cependant, étant donné l'importance de la voie de signalisation de la sphingosine 1-phosphate dans la neurogenèse pendant l'embryogenèse, une évaluation plus approfondie de la morphologie du SNC et des tâches d'apprentissage et de mémorisation plus complexes que le test d'évitement passif aurait été appropriés. Pour les paramètres évalués dans cette étude, la DSENO pour la toxicité maternelle et pré- et postnatale était de 2,0 mg/kg/jour, ce qui représente une exposition au médicament actif et à ses métabolites combinés (ozanimod + CC112273 + CC1084037) chez

le rat 5,6 fois supérieure à celle associée à la DMRH.

## LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

### RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT

#### PrZEPOSIA<sup>MD</sup>

#### Ozanimod (sous forme de chlorhydrate d'ozanimod)

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre ZEPOSIA et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état médical et de votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de ZEPOSIA.

#### **Pourquoi ZEPOSIA est-il utilisé?**

ZEPOSIA est utilisé pour traiter les patients adultes atteints de la forme récurrente et rémittente de la sclérose en plaques (SEP RR).

L'utilisation de ZEPOSIA n'est pas autorisée chez les enfants.

#### **Comment ZEPOSIA agit-il?**

L'ozanimod, l'ingrédient médicinal de ZEPOSIA, se lie de façon sélective à certains récepteurs sur vos globules blancs. Cela permet de retenir les globules blancs dans vos ganglions lymphatiques et de réduire le nombre de globules blancs circulant dans votre corps. On ne sait pas comment ZEPOSIA agit, mais on croit qu'il pourrait réduire le nombre de globules blancs qui entrent dans votre système nerveux central, où ils pourraient causer une inflammation et des dommages à l'enveloppe protectrice des nerfs.

#### **Quels sont les ingrédients de ZEPOSIA?**

Ingrédients médicinaux : ozanimod (sous forme de chlorhydrate d'ozanimod)

Ingrédients non médicinaux : cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, dioxyde de silicium colloïdal, stéarate de magnésium. La capsule est faite de dioxyde de titane (E171), d'encre pharmaceutique, de gélatine, d'oxyde de fer jaune (E172), d'oxyde de fer noir (E172) et d'oxyde de fer rouge (E172).

#### **ZEPOSIA est offert sous les formes posologiques qui suivent :**

Capsules de 0,23 mg, 0,46 mg et 0,92 mg

#### **Ne prenez pas ZEPOSIA si :**

- vous êtes allergique à l'ozanimod ou à l'un des autres ingrédients de ZEPOSIA (voir la section **Quels sont les ingrédients de ZEPOSIA** ci-dessus)
- vous courez un risque accru d'infection opportuniste, c'est-à-dire que votre système immunitaire est affaibli parce que:
  - vous recevez un traitement qui affaiblit votre système immunitaire (traitement anticancéreux, immunosuppresseur ou immunomodulateur, irradiation lymphoïde totale ou greffe de moelle osseuse)
  - vous êtes malade (syndrome d'immunodéficience)
- vous avez eu au cours des 6 derniers mois :
  - crise cardiaque
  - angine de poitrine instable
  - accident vasculaire cérébral (AVC) ou signes avant-coureurs d'un AVC
  - aggravation soudaine des signes et symptômes d'une insuffisance cardiaque ayant

nécessité un traitement, avez été diagnostiqué d'une insuffisance cardiaque de classe III ou IV, ou de certains types d'insuffisance cardiaque, au cours des 6 derniers mois

- vous avez ou avez eu certains types de battements cardiaques irréguliers ou anormaux (arythmie) qui ne sont pas corrigés par un stimulateur cardiaque
- vous avez présentement une infection, comme une hépatite ou la tuberculose
- vous êtes atteint d'un cancer (à l'exception d'un type de cancer de la peau appelé carcinome basocellulaire)
- vous prenez certains médicaments appelés inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAO) (p. ex. sélégiline, phénelzine et linézolide)
- vous êtes enceinte, croyez l'être ou prévoyez le devenir
- vous êtes en âge d'avoir des enfants et n'utilisez aucune méthode de contraception efficace
- vous êtes en âge d'avoir des enfants et votre médecin n'a pas effectué de test de grossesse pour vérifier si vous êtes enceinte avant de commencer le traitement

**Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre ZEPOSIA, afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment si :**

- vous avez ou avez eu des problèmes cardiaques :
  - rythme cardiaque irrégulier ou anormal (arythmie)
  - crise cardiaque
  - maladie cardiaque grave
  - tension artérielle élevée non maîtrisée
  - antécédents d'AVC ou d'autres maladies liées aux vaisseaux sanguins du cerveau
  - rythme cardiaque lent ou vous prenez ou avez pris récemment des médicaments ralentissant votre rythme cardiaque (comme des bêtabloquants ou des inhibiteurs des canaux calciques)
- vous avez des problèmes respiratoires graves non traités quand vous dormez (apnée du sommeil grave)

Votre médecin pourrait décider de ne pas utiliser ZEPOSIA si vous avez ou avez eu l'une des affections ci-dessus, ou il pourrait vous référer à un cardiologue avant de commencer le traitement.

- vous prenez d'autres médicaments :
  - qui ont pour but d'abaisser votre tension artérielle
  - pour traiter un battement cardiaque irrégulier (médicaments qui entraînent un allongement de l'intervalle QT)
  - qui ralentissent votre rythme cardiaque

Selon les médicaments que vous prenez, votre médecin pourrait décider de ne pas utiliser ZEPOSIA ou vous référer à un cardiologue pour qu'il modifie votre médication (voir la section **Les produits qui suivent pourraient être associés à des interactions médicamenteuses avec ZEPOSIA** ci-dessous pour plus d'information).

- vous avez une infection. ZEPOSIA réduit votre nombre de globules blancs, ce qui peut accroître votre risque d'infection, y compris le risque d'infection grave et potentiellement mortelle. Ce risque est accru pendant le traitement par ZEPOSIA et jusqu'à 3 mois après l'arrêt de ce dernier. Votre médecin devrait effectuer une analyse sanguine complète pour vérifier votre nombre de globules blancs avant de commencer le traitement (si vous n'avez pas subi un tel test au cours des 6 derniers mois), pendant le traitement et après l'arrêt du

traitement.

- vous n'avez jamais eu la varicelle ou n'avez jamais été vacciné contre la varicelle (virus varicelle-zona). Votre médecin vérifiera vos taux d'anticorps contre le virus et pourrait décider de vous vacciner si vous n'en avez pas suffisamment. Si vous vous faites vacciner, vous commencerez le traitement 1 mois après la fin de la vaccination complète.
- vous n'avez pas été vacciné contre :
  - le virus du papillome humain (VPH). Votre médecin décidera si vous devez être vacciné contre le virus du papillome humain (VPH) avant de commencer le traitement. Si vous êtes une femme, votre médecin pourrait recommander un test de dépistage du VPH. Des infections par le VPH, y compris des papillomes, des dysplasies, des verrues et des cancers liés au VPH, ont été signalées chez des patients traités par des médicaments similaires à ZEPOSIA.
  - le virus herpès zoster (virus du zona). Des cas d'infections par le virus de l'herpès ont été signalés chez des patients traités par des médicaments similaires à ZEPOSIA.
- vous prévoyez recevoir un vaccin :
  - vous ne devriez pas recevoir certains types de vaccins (appelés « vaccins vivants atténués ») pendant que vous êtes traité par ZEPOSIA et jusqu'à 3 mois après l'arrêt du traitement
- votre système immunitaire est affaibli en raison d'une maladie ou de médicaments qui répriment votre système immunitaire. Il se peut que vous soyez plus sensible aux infections ou qu'une infection que vous avez déjà s'aggrave. ZEPOSIA réduit votre nombre de globules blancs pendant le traitement et jusqu'à 3 mois après l'arrêt du traitement.
- vous n'avez pas subi de test pour vérifier votre fonction hépatique au cours des 6 derniers mois
- vous avez des problèmes respiratoires. ZEPOSIA peut entraîner un léger effet sur votre fonction pulmonaire.
- vous avez ou avez eu :
  - des changements dans votre vision ou d'autres signes de gonflement dans la zone centrale de la vision à l'arrière de l'œil, une affection connue sous le nom d'œdème maculaire
  - une maladie de la rétine
  - une inflammation ou une infection de l'œil (uvéite), ou
  - un diabète

La macula est une petite zone de la rétine située à l'arrière de l'œil. Elle permet de distinguer les formes, les couleurs et les détails de façon claire et nette. ZEPOSIA peut provoquer un gonflement de la macula à tout moment pendant le traitement.

Votre risque de développer un œdème maculaire est plus élevé si vous êtes atteint de diabète, si vous avez déjà eu une inflammation ou une infection de l'œil ou si vous recevez un traitement de longue durée par ZEPOSIA.

Votre médecin pourrait décider d'effectuer un examen de votre vue :

- avant de commencer le traitement par ZEPOSIA
- pendant le traitement
- à tout moment pendant votre traitement si vous remarquez des changements dans votre vision. Informez votre médecin de tout changement dans votre vision.

- vous avez des problèmes de foie. ZEPOSIA peut altérer votre fonction hépatique. Si vous remarquez l'un des symptômes suivants, dites-le **immédiatement** à votre médecin :
  - jaunissement de la peau ou du blanc des yeux
  - urine anormalement foncée
  - nausées ou vomissements inexpliqués
  - fatigue

Votre médecin pourrait effectuer des analyses sanguines pour vérifier votre fonction hépatique et pourrait envisager d'arrêter votre traitement par ZEPOSIA si votre problème de foie est grave.

**Autres mises en garde à connaître :**

### **APRÈS L'ARRÊT DU TRAITEMENT**

- ZEPOSIA restera dans votre corps pendant environ 3 mois après l'arrêt du traitement. Votre nombre de globules blancs pourrait rester faible pendant cette période. Les effets secondaires décrits dans ce dépliant pourraient tout de même survenir.
- Vos symptômes de SEP pourraient revenir et s'aggraver par rapport à ce qu'ils étaient avant ou pendant le traitement. Informez votre médecin si les symptômes de votre SEP s'aggravent après l'arrêt du traitement par ZEPOSIA.

**Patients prenant des médicaments immunosuppresseurs ou immunomodulateurs :** vous pourriez courir un risque accru de cancer, en particulier de cancer de la peau. Des carcinomes basocellulaires ont été signalés chez des patients recevant ZEPOSIA. Votre médecin devrait vérifier la présence de toute excroissance anormale sur votre peau avant de commencer le traitement, puis régulièrement pendant votre traitement par ZEPOSIA, surtout si vous présentez un risque plus élevé de cancer de la peau. Pendant le traitement, vous devriez :

- vérifier régulièrement l'apparition de changements inhabituels sur votre peau
- limiter la durée de votre temps d'exposition au soleil et aux rayons UV. Portez des vêtements de protection et appliquez régulièrement un écran solaire ayant un haut degré de protection contre les rayons UV.

**Dépression, idées suicidaires et comportement suicidaire :** Les patients atteints de SEP sont connus pour présenter de telles réactions. Des idées et des comportements suicidaires ont été signalés chez des patients prenant ZEPOSIA. Dites à votre famille que vous prenez ce médicament. Si vous, votre proche aidant ou les membres de votre famille remarquez des changements dans votre humeur ou si vous commencez à penser à vous faire physiquement du mal, **contactez immédiatement votre médecin.**

**Grossesse :** **Vous devez éviter de devenir enceinte pendant que vous prenez ZEPOSIA et pendant au moins 3 mois après avoir arrêté de le prendre avant de planifier une grossesse.** ZEPOSIA peut nuire à votre bébé à naître. Les femmes susceptibles de devenir enceintes doivent utiliser des méthodes de contraception efficaces pendant le traitement et pendant au moins 3 MOIS après l'arrêt de ZEPOSIA. Demandez à votre médecin quelles sont vos options en matière de contraception efficace (voir la section **Ne prenez pas ZEPOSIA si**).

- Si vous devenez enceinte ou pensez l'être, informez-en immédiatement votre médecin. Vous et votre médecin déciderez de ce qui est le mieux pour vous et votre bébé.

**Allaitement: Vous ne devez pas allaiter pendant que vous prenez ZEPOSIA.** ZEPOSIA peut passer dans le lait maternel et il existe un risque d'effets secondaires graves pour le bébé allaité. Parlez à votre médecin avant d'allaiter si vous prenez ZEPOSIA.

#### **Analyses de laboratoire :**

- Résultats anormaux aux tests de la fonction hépatique : des taux élevés des enzymes appelées alanine aminotransférase (ALT), gamma-glutamyltransférase (GGT) et aspartate aminotransférase (AST) ont été signalés chez des patients atteints de SEP qui prenaient ZEPOSIA.
- Résultats des tests de la fonction pulmonaire anormalement bas : des diminutions de la fonction pulmonaire (respiration) à différents tests ont été signalées chez des patients atteints de SEP qui prenaient ZEPOSIA.

Informez immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants pendant votre traitement par ZEPOSIA. Cela pourrait être grave :

- si vous pensez que votre SEP s'aggrave (p. ex. faiblesse ou changements visuels) ou si vous remarquez des symptômes nouveaux ou inhabituels. Il pourrait s'agir de symptômes de **leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP)**, un trouble rare du cerveau causé par une infection.
- si vous avez de la fièvre, si vous avez l'impression d'avoir la grippe ou si vous avez un mal de tête accompagné d'une raideur au cou, d'une sensibilité à la lumière, de nausées et/ou de confusion. Il pourrait s'agir de symptômes d'une **méningite cryptococcique**, causée par une infection fongique.
- si vous présentez des symptômes tels un mal de tête soudain et intense, de la confusion, des convulsions, des changements de comportement et des changements dans votre vision. Il pourrait s'agir de symptômes d'une maladie appelée **syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible (SEPR)**.

**Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou produits de médecine alternative.**

Si l'une de ces situations s'applique à vous, informez-en votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ZEPOSIA.

**Les produits qui suivent pourraient être associé à des interaction médicamenteuses avec ZEPOSIA :**

- **Médicaments visant à traiter un rythme cardiaque irrégulier (médicaments qui entraînent un allongement de l'intervalle QT)**
  - procaïnamide
  - amiodarone
  - sotalol

Votre médecin pourrait décider de vous référer à un cardiologue pour changer votre médicament avant de commencer le traitement par ZEPOSIA.

- **Médicaments qui ralentissent les battements de votre cœur, par exemple :**
  - bêtabloquants (comme l'aténolol ou le propranolol)
  - inhibiteurs des canaux calciques (comme le vérapamil ou le diltiazem)
  - cholinomimétiques
  - autres substances qui peuvent diminuer votre fréquence cardiaque (ivabradine ou digoxine)

ZEPOSIA peut ralentir votre rythme cardiaque au début du traitement. Votre médecin pourrait décider de vous référer à un cardiologue pour changer votre médicament avant de commencer le traitement.

- **Médicaments qui inhibent ou modulent le système immunitaire, y compris d'autres médicaments utilisés pour traiter la SEP et des médicaments utilisés pour traiter le cancer :**

- bêta-interférons
- acétate de glatiramère
- natalizumab
- mitoxantrone
- fumarate de diméthyle
- térifunomide
- alemtuzumab
- corticostéroïdes
- ocrélizumab

Il ne faut pas commencer à prendre ZEPOSIA pendant que vous recevez ces médicaments ou changez votre médication vers ZEPOSIA ou vers un autre traitement de la SEP ayant des effets immunosuppresseurs ou immunomodulateurs. Votre médecin pourrait décider d'attendre plusieurs semaines après l'arrêt de ces médicaments avant de commencer ZEPOSIA, afin de réduire l'effet additif possible sur votre système immunitaire. Le traitement par ZEPOSIA peut généralement être amorcé immédiatement après l'arrêt de l'interféron bêta ou de l'acétate de glatiramère.

- **Vaccins.** Si vous avez besoin de recevoir un vaccin, parlez-en d'abord à votre médecin. Pour plus d'information sur les vaccins, veuillez consulter la section **Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre ZEPOSIA, afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du médicament** ci-dessus.

- **Tyramine :** Certains aliments qui peuvent contenir de très grandes quantités de tyramine (aliments vieillis, fermentés, salés, fumés et marinés [p. ex. fromage vieilli, hareng mariné]) peuvent provoquer (réaction à la tyramine) une hypertension grave (élévation de la tension artérielle) chez les patients qui prennent ZEPOSIA, même aux doses recommandées. Vous devriez éviter les aliments qui contiennent une grande quantité de tyramine pendant que vous prenez ZEPOSIA.

La coadministration de ZEPOSIA et des médicaments suivants peut entraîner des effets indésirables graves, notamment une augmentation soudaine et importante de la tension artérielle (crise hypertensive) et une toxicité liée à la sérotonine :

- le traitement par des médicaments opioïdes (p. ex. mépéridine et ses dérivés, méthadone, propoxyphène, tramadol ou tapentadol) n'est pas recommandé.
- le traitement par médicaments sérotoninergiques (p. ex. inhibiteurs du recaptage de la sérotonine-norépinéphrine [IRSN], inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine [ISRS], antidépresseurs tricycliques, tétracycliques ou triazolopyridiniques, cyclobenzaprine ou millepertuis) n'est pas recommandé.
- le traitement par des médicaments sympathomimétiques (p. ex. rasagiline) peut entraîner



une augmentation de la tension artérielle.

Syndrome sérotoninergique :

ZEPOSIA peut causer un syndrome sérotoninergique, une affection rare mais potentiellement mortelle qui pourrait entraîner de graves changements dans le fonctionnement de votre cerveau, de vos muscles et de votre appareil digestif. Vous pourriez développer un syndrome sérotoninergique si vous prenez ZEPOSIA avec certains antidépresseurs ou antimigraineux.

Les symptômes du syndrome sérotoninergique comprennent les suivants :

- fièvre, transpiration, frissons, diarrhée, nausées, vomissements
- tremblements, secousses, tics ou raideurs musculaires, réflexes exagérés, perte de coordination
- rythme cardiaque rapide, changements dans la tension artérielle
- confusion, agitation, nervosité, hallucinations, changements d'humeur, perte de conscience et coma

**Comment prendre ZEPOSIA :**

**Avant de commencer le traitement :**

Votre médecin :

- effectuera un électrocardiogramme (ECG) pour vérifier la présence de toute affection cardiaque préexistante. Si vous êtes atteint de certains troubles cardiaques ou présentez certains facteurs de risque, la première dose de ZEPOSIA devra être prise au cabinet de votre médecin ou à l'hôpital, endroits où votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle pourront être surveillés (mesures de votre tension artérielle et de votre pouls toutes les heures, surveillance par ECG) pendant au moins 6 heures.
- effectuera :
  - des tests hépatiques (foie) si vous n'en avez pas subi au cours des 6 derniers mois
  - une analyse sanguine complète si vous n'en avez pas subi une au cours des 6 derniers mois
  - un dosage de vos anticorps contre le virus de la varicelle (virus varicelle-zona)
  - un test de grossesse, si vous êtes une femme en âge d'avoir des enfants
- vérifiera si vous avez une infection grave
- vérifiera l'historique de vos médicaments

Votre médecin pourrait également :

- vous faire passer un examen de la vue si vous avez ou avez déjà eu une uvéite (gonflement de la couche moyenne du tissu de la paroi de l'œil), des antécédents de troubles rétinien ou de diabète

**Dose habituelle :**

**Les jours 1 à 7 (Trousse de Départ) :**

- Lorsque vous commencerez le traitement par ZEPOSIA, vous recevez une Trousse de Départ qui contient 7 capsules. Sur une période de 7 jours, vous augmenterez graduellement et lentement votre dose. Suivez les directives figurant sur la Trousse de Départ et dans le tableau ci-dessous.

- Prenez vos doses de départ une fois par jour, à peu près à la même heure chaque jour, avec ou sans nourriture. Avalez les capsules entières avec de l'eau. Ne pas ouvrir, briser ou mâcher les capsules.

Administration des capsules de la Trousse de Départ :

<b>Jour</b>	<b>Dose quotidienne</b>	<b>Couleur de la capsule</b>
Jours 1 à 4	0,23 mg (1 fois par jour)	Gris clair
Jours 5 à 7	0,46 mg (1 fois par jour)	Gris clair et orange

**Le jour 8 et les jours suivants (dose d'entretien) :**

- Passez à votre dose d'entretien.
- La dose recommandée est de 0,92 mg (capsule orange) une fois par jour.
- Prenez ZEPOSIA exactement comme votre professionnel de la santé vous dit de le faire.
- Prenez votre dose d'entretien une fois par jour, **à peu près à la même heure chaque jour**, avec ou sans nourriture. Avalez les capsules entières avec de l'eau. Ne pas ouvrir, briser ou mâcher les capsules.
- Continuez à prendre ZEPOSIA tous les jours aussi longtemps que votre médecin vous le dira. Ne cessez pas de prendre ce médicament sans avoir consulté votre médecin.

**IMPORTANT – Doses oubliées :**

Si vous oubliez une dose entre le jour 1 et le jour 14 de traitement :

- Contactez immédiatement votre médecin avant de prendre la dose suivante.
- Vous devrez recommencer le traitement (à partir du jour 1) avec une nouvelle Trousse de Départ.
- Ne doublez pas la dose pour compenser une dose oubliée.

Si vous oubliez de 1 à 7 doses après 14 jours de traitement :

- Continuez le traitement comme prévu

Si vous oubliez plus de 7 doses après 14 jours de traitement

- Consultez votre médecin pour savoir comment reprendre votre traitement (à partir du jour 1) si vous avez arrêté de prendre ZEPOSIA :
  - pendant plus de 7 jours consécutifs entre les jours 15 et 28 du traitement.
  - pendant plus de 14 jours consécutifs après le jour 28 du traitement
- Contactez immédiatement votre professionnel de la santé dans l'une ou l'autre de ces situations.
- Ne doublez pas la dose pour compenser une dose oubliée.

Si vous avez des questions sur la durée du traitement par ZEPOSIA, parlez-en à votre professionnel de la santé.

## Surdosage :

Si vous croyez avoir pris trop de ZEPOSIA, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptôme.

## Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à ZEPOSIA?

En prenant ZEPOSIA, vous pourriez ressentir des effets secondaires autres que ceux qui figurent dans cette liste. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

- maux de tête
- maux de dos
- infections touchant :
  - le nez ou les narines
  - la cavité nasale
  - la bouche
  - la gorge (pharynx), ou
  - le larynx
- infection respiratoire
- tension artérielle basse lorsque vous vous mettez debout (hypotension orthostatique)

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Communiquez avec votre professionnel de la santé.		Cessez de prendre le médicament et consultez un médecin immédiatement
	Uniquement si l'effet est sévère	Dans tous les cas	
<b>COURANT</b>			
<b>Hypertension</b> (tension artérielle élevée) : essoufflement, fatigue, étourdissements ou évanouissement, douleur ou pression dans la poitrine, enflure des chevilles et des jambes, couleur bleuâtre des lèvres et de la peau, accélération du pouls ou palpitations cardiaques		✓	
<b>Lymphopénie</b> (faible nombre de lymphocytes, un type de globule blanc) : sensibilité aux infections, fièvre, mal de gorge ou ulcères buccaux dus à une infection		✓	
<b>Infection des voies urinaires</b> : douleur ou sensation de brûlure en urinant, sang dans l'urine ou urine trouble ou malodorante		✓	
<b>PEU COURANT</b>			
<b>Réaction allergique</b> : éruption cutanée, rougeur, démangeaisons cutanées, urticaire	✓		

<b>Bloc auriculoventriculaire</b> (battement cardiaque irrégulier)		✓	
<b>Bradycardie</b> (faible rythme cardiaque) : étourdissements, fatigue, évanouissement, douleur à la poitrine		✓	
<b>Zona</b> (varicelle) : éruption de petites ampoules remplies de liquide, apparaissant sur des zones de peau rouges		✓	
<b>Œdème maculaire</b> (gonflement et accumulation de liquide au centre de la rétine) : vision trouble, vision floue ou ondulante au centre de votre champ de vision ou près de ce dernier; les couleurs peuvent sembler ternes ou pâles		✓	
<b>Nævus mélanique</b> (un type de tumeur/grain de beauté)		✓	
<b>RARE</b>			
<b>Syndrome d'encéphalopathie postérieure réversible (SEPR)</b> (les symptômes peuvent inclure maux de tête soudain, sensation de nausée ou vomissement, confusion, somnolence, changement de personnalité, paralysie, difficulté à parler, convulsions, changements de la vision)			✓
<b>FRÉQUENCE INCONNUE</b>			
<b>Accident vasculaire cérébral, AVC ischémique, accident ischémique transitoire (AVC)</b> : Engourdissement ou faiblesse soudains d'un bras, d'une jambe ou du visage, surtout si un seul côté du corps est touché; confusion soudaine; difficulté à parler ou à comprendre les autres; difficulté soudaine à marcher ou perte d'équilibre ou de coordination; sensation soudaine de vertige ou mal de tête soudain et violent sans cause connue			✓
<b>Infections cryptococciques</b> (un type d'infection fongique), y compris méningite cryptococcique : maux de tête accompagnés d'une raideur de la nuque, d'une sensibilité à la lumière, de nausées et/ou de confusion		✓	

<b>Méningite causée par le virus herpès zoster :</b> maux de tête, vomissements répétés			✓
<b>Leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP),</b> infection rare au cerveau (les symptômes peuvent inclure, faiblesse d'un côté du corps, difficulté à penser, changements de la vision)		✓	
<b>Syndrome sérotoninergique :</b> agitation ou nervosité, perte de contrôle musculaire ou fasciculations (spasmes) musculaires, tremblements, diarrhée			✓

En cas de symptôme ou malaise non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un malaise vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

#### Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit de santé en :

- visitant le site Web des déclarations des effets indésirables <http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur; ou
- téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

*REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.*

#### Entreposage :

Conserver entre 15 °C et 25 °C. Ne pas conserver à une température supérieure à 25 °C.

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas prendre ce médicament après la date de péremption inscrite sur la boîte.

Conserver dans l'emballage d'origine.

Demandez à votre pharmacien comment vous débarrasser des médicaments que vous n'utilisez plus.

#### Pour en savoir davantage au sujet de ZEPOSIA, vous pouvez :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements pour le patient sur les médicaments.

Ce document est disponible sur le [site Web de Santé Canada](http://hc-sc.gc.ca/index-fra.php) (<http://hc-sc.gc.ca/index-fra.php>) et le site Web du fabricant ([www.celgene.ca](http://www.celgene.ca)), ou peut être obtenu en téléphonant au 1-877-923-5436.

Le présent dépliant a été rédigé par Celgene Inc. une entreprise de Bristol Myers Squibb. ZEPOSIA est une marque déposée de Celgene Corporation, utilisée sous licence par Celgene Inc.

Dernière révision : 2 octobre 2020