

CAMZYOS® ▼ (Mavacamten)

Patientenleitfaden

Version 1.0, Juli 2023
3500-CH-2300016



▼ Dieses Arzneimittel unterliegt zusätzlicher Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie alle Ihre Nebenwirkungen melden. Wie Sie Nebenwirkungen melden können, entnehmen Sie bitte dem Ende des Abschnitts „Mögliche Nebenwirkungen“ in der Patienteninformation.

EINLEITUNG

Sie haben diesen **Patientenleitfaden** erhalten, weil Ihnen CAMZYOS verschrieben wurde. CAMZYOS ist ein rezeptpflichtiges Herzmedikament zur Behandlung von Erwachsenen mit symptomatischer obstruktiver hypertropher Kardiomyopathie.

CAMZYOS™▼ (Mavacamten)
**KARTE FÜR
PATIENTINNEN
UND PATIENTEN**

Dieser **Patientenleitfaden** enthält eine **Patientenkarte**. **Bitte tragen Sie diese Patientenkarte immer bei sich**. Informieren Sie alle Ihre Ärztinnen und Ärzte, die Sie behandeln, dass Sie CAMZYOS erhalten. Die **Patientenkarte** umfasst Angaben zu den hauptsächlichen Risiken von CAMZYOS sowie die Kontaktangaben Ihrer Ärztin oder Ihres Arztes*.

Bitte lesen Sie die Packungsbeilage für dieses Arzneimittel, die weitere Informationen zu CAMZYOS enthält. Wenn Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie mit Ihrer Ärztin oder Ihrer Apotheke.

* Die in diesem Patientenleitfaden/dieser Patientenkarte gewählte Form der persönlichen Bezeichnung (z. B. Ärztin / Arzt, Patientin / Patient) bezieht sich gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen.



WAS IST SYMPTOMATISCHE OBSTRUKTIVE HYPERTROPHE KARDIOMYOPATHIE?

Hypertrophe Kardiomyopathie entsteht, wenn sich die Herzmuskelwand verdickt und versteift, wodurch es für das Herz schwieriger wird, sich mit Blut zu füllen. Bei einigen betroffenen Patienten wird der Herzmuskel so dick, dass er den Blutfluss vom Herzen zum Rest des Körpers verringert oder gar blockiert.



WIE WIRKT CAMZYOS?

CAMZYOS wirkt, indem es die übermässige Kontraktion des Herzmuskels und die Einschränkung des Blutflusses zum Körper reduziert. Infolgedessen kann es Ihre Symptome und körperliche Leistungsfähigkeit verbessern.

Was sind Echokardiogramme und warum sind sie wichtig?

Regelmässige Echos (Echokardiogramme) helfen Ihrer Ärztin bei der Beurteilung, wie CAMZYOS bei Ihrem Herz wirkt. Ein Echo ist eine Ultraschalluntersuchung, die Bilder von Ihrem Herzen macht. Damit kann der Arzt feststellen, wie Ihr Herz auf die Behandlung anspricht, und sicherstellen, dass Sie die optimale Dosis erhalten. Je nach den Echo-Ergebnissen kann bei Bedarf Ihre CAMZYOS-Dosis erhöht, verringert oder gleich behalten werden, oder Ihre Behandlung wird unterbrochen oder beendet. Das erste Echo wird vor Beginn mit CAMZYOS erfolgen. Dann werden 4, 8 und 12 Wochen nach der ersten Behandlung mit CAMZYOS und schliesslich alle 12 Wochen Echos durchgeführt.

Falls Ihre Dosis von CAMZYOS oder eines Ihrer anderen Medikamente geändert wird, muss je nach Anordnung der Ärztin ein Echo stattfinden. Das heisst, dass bei Ihnen 4 Wochen nach einer Dosisänderung eine Echo-Nachkontrolle erfolgen wird, und eine weitere nach weiteren 8 Wochen. Danach geht es wieder mit dem normalen 12-wöchigen Echo-Zeitplan weiter.



Es ist wichtig, dass die Echos gemäss Anordnung Ihres Arztes geplant und durchgeführt werden. Richten Sie Erinnerungen auf Ihrem Handy oder in Ihrem Kalender ein, damit Sie sich an die Termine für die Echos erinnern können.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Es gibt drei Hauptrisiken im Zusammenhang mit der Therapie mit CAMZYOS:

- Herzversagen aufgrund einer Herzfunktionsstörung, einer Erkrankung, bei der das Herz nicht genügend Blut in den Körper pumpen kann
- Herzversagen aufgrund von Wechselwirkungen mit bestimmten Medikamenten und pflanzlichen Präparaten
- Schädigungen eines ungeborenen Kindes

Weitere mögliche Nebenwirkungen im Zusammenhang mit CAMZYOS können der Packungsbeilage entnommen werden.

CAMZYOS und Herzversagen

Herzversagen aufgrund einer Herzfunktionsstörung ist eine schwere und manchmal tödliche Erkrankung.

Informieren Sie Ihren Arzt oder suchen Sie **sofort** ärztliche Hilfe auf, wenn bei Ihnen neue oder sich verschlechternde Symptome eines Herzversagens auftreten, darunter Kurzatmigkeit, Schmerzen in der Brust, Ermüdung, Herzklopfen und Beinschwellungen.

Informieren Sie Ihre Ärztin über alle neuen und bestehenden Erkrankungen, die Sie vor und während der Therapie mit CAMZYOS haben. Bestimmte Erkrankungen wie schwere Infektionen oder Herzrhythmusstörungen (unregelmässiger und schneller Herzschlag) können die Therapie mit CAMZYOS beeinträchtigen.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE (FORTSETZUNG)

Arzneimittelwechselwirkungen mit CAMZYOS

Einige rezeptpflichtige und -freie Medikamente und einige pflanzliche Präparate können den CAMZYOS-Spiegel im Körper beeinflussen und das Risiko für ein Herzversagen aufgrund einer Herzfunktionsstörung erhöhen. Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Ihre Apotheke über alle rezeptpflichtigen und -freien Medikamente und pflanzlichen Präparate, die Sie einnehmen (auch wenn Sie diese nicht täglich einnehmen), vor kurzem eingenommen haben, deren Dosis Sie geändert haben oder die Sie bald absetzen. Beginnen, ändern oder setzen Sie **keine** Ihrer Medikamente und pflanzlichen Präparate ohne vorgängige Absprache mit Ihrem Arzt oder Ihrer Apotheke ab.

Einige Beispiele für Medikamente und Produkte, die sich auf die Konzentration von CAMZYOS im Körper auswirken können, werden in **Tabelle 1** aufgeführt. Bitte beachten Sie, dass diese Beispiele ein Leitfaden sind und keine umfassende Liste aller Medikamente, die in diese Kategorie passen könnten, darstellen. Eine unregelmässige Anwendung von Produkten, die die Konzentration von CAMZYOS im Körper beeinflussen können, darunter rezeptpflichtige und -freie Medikamente, pflanzliche Präparate und Grapefruitsaft, wird nicht empfohlen.

Tabelle 1: Beispiele für Medikamente und Produkte, die Auswirkungen auf CAMZYOS haben können

Medikamente / Produkte	Behandelte Erkrankung
Omeprazol, Esomeprazol	Magengeschwüre und Magenbrennen
Clarithromycin	Bakterielle Infektionen
Rifampicin, Isoniazid	Tuberkulose
Verapamil, Diltiazem	Herzerkrankungen
Modafinil	Narkolepsie
Fluconazol, Itraconazol, Ketoconazol, Posaconazol, Voriconazol	Pilzinfektionen
Fluoxetin, Fluvoxamin, Moclobemid	Depression
Ritonavir, Cobicistat	Humanes Immundefizienzvirus (HIV)
Telaprevir	Hepatitis C
Ticlopidin	Vorbeugung von Blutgerinnseln
Topiramamat	Krampfanfälle und Migränekopfschmerzen
Disopyramid, Amiodaron	Herzerkrankungen
Apalutamid, Enzalutamid, Dabrafenib, Mitotan	Krebs
Carbamazepin, Phenytoin	Krampfanfälle oder Epilepsie
Johanniskraut	Depression
Grapefruitsaft	



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE (FORTSETZUNG)

Risiko von Schädigungen eines ungeborenen Kindes durch Einnahme von CAMZYOS

CAMZYOS darf nicht eingenommen werden, wenn Sie schwanger sind bzw. wenn Sie schwanger werden können und keine hochwirksame Verhütungsmethode anwenden, da es für ein ungeborenes Kind schädlich sein kann.

Wenn Sie schwanger werden können, muss ein negativer Schwangerschaftstest vorliegen, bevor Sie die Therapie mit CAMZYOS beginnen können. Während der Therapie und bis mindestens 4 Monate nach der letzten Behandlung mit CAMZYOS ist eine hochwirksame Verhütungsmethode anzuwenden. Ihr Arzt wird mit Ihnen die für Sie am besten geeignete Verhütungsmethode besprechen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrer Ärztin, wenn Sie eine Schwangerschaft in Erwägung ziehen. Falls Sie während der Therapie mit CAMZYOS vermuten, dass Sie schwanger sein könnten oder sind, müssen Sie **umgehend** Ihren Arzt informieren. Ihre Ärztin wird die Therapie abbrechen.



WANN SOLLTE ICH EINE ÄRZTIN/EINEN ARZT AUFsuchen?

Informieren Sie während der Therapie mit CAMZYOS alle Ihre Ärzte über Nebenwirkungen, auch wenn diese nicht in diesem **Patientenleitfaden** erwähnt worden sind. Mögliche Nebenwirkungen und Einzelheiten dazu, wie diese zu melden sind, können der Packungsbeilage entnommen werden. Die Schweizer Gesundheitsbehörde Swissmedic über Nebenwirkungen zu informieren, hilft bei der Erfassung zusätzlicher Sicherheitsinformationen zu diesem Medikament.

Informieren Sie Ihre Ärztin oder suchen Sie **sofort** ärztliche Hilfe auf, wenn bei Ihnen neue oder sich verschlechternde Symptome eines Herzversagens auftreten, darunter Kurzatmigkeit, Schmerzen in der Brust, Müdigkeit, Herzklopfen (wie das Gefühl eines abnormalen Herzschlags oder von Herzrasen) oder Beinschwellungen.




WEITERE INFORMATIONEN

Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich CAMZYOS haben, besprechen Sie diese bitte mit Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt, Ihrer Apotheke oder einem Mitglied Ihres Behandlungsteams.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Telefon: +41 (0)41 767 7255

E-Mail: medinfo.switzerland@bms.com





ANMERKUNGEN
