

Tragen Sie diese Patientenkarte
ständig bei sich.

Zeigen Sie diese Karte Ihrer
Apothekerin, Ihrem Apotheker,
Ihrer Zahnärztin, Ihrem
Zahnarzt und allen Ärztinnen
und Ärzten, die Sie behandeln.

Ich werde mit dem Antiko-
agulans Eliquis® (Apixaban)
behandelt, um der Entstehung
von Blutgerinnseln vorzubeugen.

Bristol-Myers Squibb, Eliquis® (Apixaban),
Patientenkarte, (ARMM) Jun24_V3. PromoMats
approval number: 432-CH-2400007.

Bitte füllen Sie diesen Abschnitt
aus oder bitten Sie Ihre Ärztin
oder Ihren Arzt darum.

Name:

.....
.....

Geburtsdatum:

.....
.....

Indikation:

.....
.....
.....
.....

Dosierung: mg,
zweimal täglich

Name der Ärztin oder des Arztes:

.....
.....

Telefonnummer der Ärztin oder des
Arztes:

.....
.....
.....

Eliquis®

(Apixaban)

Patientenkarte

Information für Patienten

- Nehmen Sie Eliquis® regelmässig nach den Anweisungen ein. Wenn Sie eine Dosis versäumt haben, nehmen Sie das Arzneimittel sofort ein, sobald Sie sich daran erinnern, und setzen Sie danach die Einnahme mit der verbleibenden Tagesdosis fort.
- Brechen Sie die Behandlung mit Eliquis® nicht ohne vorherige Rücksprache mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt ab, da bei Ihnen das Risiko eines Schlaganfalles oder anderer Komplikationen besteht.
- Eliquis® hilft, Ihr Blut zu verdünnen. Dies kann jedoch das Risiko für Blutungen erhöhen.
- Anzeichen und Symptome von Blutungen können z. B. Blutergüsse oder Einblutungen unter der Haut, Teer-Stuhl, Blut im Urin, Nasenbluten, Schwindel, Müdigkeit, Blässe, plötzlich starke Kopfschmerzen, Abhusten von Blut oder blutiges Erbrechen sein.
- **Kontaktieren Sie sofort Ihre Ärztin bzw. Ihren Arzt, falls bei Ihnen eine Blutung nicht selbstständig aufhört.**
- Falls bei Ihnen eine Operation oder ein anderer invasiver Eingriff notwendig sein sollte, informieren Sie vor der Operation Ihre behandelnde Ärztin oder Ihren behandelnden Arzt, dass Sie Eliquis® einnehmen.

Information für medizinisches Fachpersonal

- Eliquis® (Apixaban) ist ein orales Antikoagulans, das durch die direkte, selektive Hemmung des Blutgerinnungsfaktors Xa wirkt.
- Eliquis® kann das Risiko für Blutungen erhöhen. Im Falle einer schweren Blutung ist die Behandlung mit Eliquis® unverzüglich abzubrechen.
- Die Behandlung mit Eliquis® erfordert keine Routineüberwachung der Exposition. Ein kalibrierter quantitativer Anti-Faktor Xa-Test kann in Ausnahmesituationen, z. B. bei Überdosierungen und Notfalloperationen, nützlich sein. Prothrombinzeit (PT), International Normalized Ratio (INR) und aktivierte partielle Thromboplastinzeit (aPTT) Gerinnungstests sind nicht empfohlen – siehe Fachinformation.