

Ce matériel d'information a été exigé par Swissmedic au titre de mesure de réduction des risques. Il doit garantir que les patientes et patients connaissent et prennent en compte les exigences particulières en matière de sécurité relatives à REBLOZYL. La responsabilité juridique du matériel d'information incombe à Bristol Myers Squibb.

(pour les femmes en âge de procréer)

CARTE DE PATIENT

(inspatecept)

REBLOZYL®

Matériel d'information exigé
par l'autorité compétente



On m'a prescrit REBLOZYL.

Coordonnées importantes

Médecin m'ayant prescrit REBLOZYL:

Nom: _____

Téléphone: _____

Adresse: _____

Fiche d'information du patient

REBLOZYL (substance active: luspatercept) ne doit pas être utilisé pendant la grossesse et dans les 3 mois précédant le début de la grossesse. REBLOZYL peut nuire à l'enfant à naître. Vous ne devez pas utiliser REBLOZYL si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ou si vous pouvez tomber enceinte et n'utilisez pas au moins une méthode de contraception hautement efficace.

- Avant de commencer le traitement par REBLOZYL:
 - Vous devrez présenter un test de grossesse négatif qui sera contrôlé par votre médecin prescripteur.
 - Discutez avec votre médecin des méthodes de contraception fiables et utilisez au moins une méthode de contraception hautement efficace pendant le traitement par REBLOZYL et pendant au moins 3 mois après l'arrêt de REBLOZYL.
- Pendant le traitement par REBLOZYL, les tests de grossesse doivent être répétés à intervalles appropriés et confirmés comme négatifs par un médecin.
- Informez immédiatement votre médecin si vous tombez ou pensez être enceinte pendant le traitement par REBLOZYL ou dans les 3 mois suivant l'arrêt de REBLOZYL.

Les coordonnées de votre médecin traitant se trouvent au dos de cette carte destinée aux patientes.

Pour plus d'informations sur les actions et les effets secondaires de REBLOZYL, adressez-vous à votre médecin traitant.