

Carte du patient

Ce matériel d'information a été exigé par Swissmedic au titre de mesure de réduction des risques. Il doit garantir que les patientes et patients connaissent et prennent en compte les exigences particulières en matière de sécurité relatives à Yervoy®. La responsabilité juridique du matériel d'information incombe à Bristol-Myers Squibb.



Informations IMPORTANTES destinées aux patients

Portez toujours cette carte sur vous afin d'informer le personnel médical que vous recevez Yervoy® (ipilimumab) en monothérapie.



Si vous constatez des signes ou des symptômes, informez-en immédiatement votre médecin.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES



Estomac
et
intestins

Diarrhée (selles aqueuses, non moulées ou molles), selles sanglantes ou de couleur foncée, selles plus fréquentes que d'habitude, douleurs ou sensibilité à l'estomac ou à l'abdomen, nausées ou vomissements



Yeux

Yeux rougis ou douloureux, troubles visuels ou vision floue



Glandes
hormo-
nales

Rythme cardiaque rapide, transpiration accrue, prise ou perte de poids, sensation de froid, chute des cheveux, constipation, voix plus grave, fièvre, fatigue, maux de tête, vertiges ou évanouissement, sensation de faim ou de soif plus forte que d'habitude, mictions plus fréquentes ou changements de comportement (p. ex. baisse de la libido, irritabilité ou oublis).



Foie

Jaunissement des yeux ou de la peau (jaunisse), douleurs dans la partie supérieure droite de l'abdomen, urines foncées ou saignements



Poumons

Essoufflement, toux ou douleurs thoraciques



Système
nerveux

faiblesse musculaire, sensation d'engourdissement ou picotements dans les jambes, les bras ou le visage, vertiges, perte de connaissance ou difficultés à se réveiller



Peau

Éruption cutanée avec ou sans démangeaisons, peau sèche, formation de cloques et/ou desquamation de la peau, plaies dans la bouche, gonflement du visage ou des glandes lymphatiques

AUTRES EFFETS SECONDAIRES IMPORTANTS:

Réactions sévères à la perfusion:

- Des réactions à la perfusion d'ipilimumab dans la circulation sanguine peuvent survenir, généralement pendant ou dans les 24 heures suivant l'administration d'une dose.
- Veuillez informer immédiatement votre médecin ou le personnel soignant si vous présentez les symptômes suivants pendant une perfusion d'ipilimumab: frissons ou tremblements, démangeaisons ou éruption cutanée, bouffées de chaleur, difficultés respiratoires, vertiges, fièvre ou sensation d'évanouissement.

IMPORTANT

- Informez votre médecin de toutes les maladies antérieures.
- Une prise en charge précoce des effets indésirables réduit la probabilité d'une interruption temporaire ou d'un arrêt définitif du traitement par ipilimumab.
- Même les signes et symptômes qui semblent légers peuvent s'aggraver rapidement s'ils ne sont pas traités.
- N'essayez **PAS** de traiter les symptômes par vous-même.
- Les signes et symptômes peuvent apparaître avec un certain retard, c'est-à-dire des semaines ou des mois après la dernière injection d'ipilimumab.

Si vous avez besoin d'informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre médecin traitant ou contacter le département Medical Information par e-mail: medinfo.switzerland@bms.com ou par téléphone: 041 767 72 55.

Informations IMPORTANTES destinées aux professionnels de santé

- Ce patient reçoit une monothérapie par ipilimumab.
- Des effets secondaires liés à l'immunité (immune-related adverse reactions, irAR) peuvent survenir à tout moment pendant le traitement ou même après l'arrêt de celui-ci.
- Un diagnostic précoce et un traitement approprié sont indispensables pour minimiser les complications potentiellement mortelles.
- La consultation d'un(e) oncologue ou d'un(e) spécialiste d'une autre discipline peut s'avérer utile pour le traitement des effets secondaires immunologiques spécifiques à un organe.
- Pour de plus amples informations pour le personnel médical, consultez l'information professionnelle de l'ipilimumab sur www.swissmedicininfo.ch ou contactez notre département Medical Information par e-mail à l'adresse medinfo.switzerland@bms.com ou par téléphone au 041 767 72 55.

Le médecin qui traite ce patient par ipilimumab doit remplir la rubrique «Coordonnées de mon médecin» sur cette carte du patient.

Coordonnées de mon médecin

(qui a prescrit l'ipilimumab)

Nom du médecin:

Numéro de téléphone du cabinet: _____

Numéro de téléphone en dehors des heures de consultation:

Mes coordonnées

Mon nom et mon numéro de téléphone:

Mon contact en cas d'urgence (nom et numéro de téléphone):
