

Breyanzi®

(lisocabtagene maraleucel)

PATIENTKORT

Du skal altid have dette kort på dig. Vis det til alle læger/ sundhedspersoner, som du ser, også hvis du skal på hospitalet.

- Fortæl alle sundhedspersoner, som du ser, at du får behandling med Breyanzi.
- Bliv tæt på behandlingscentret, hvor du fik Breyanzi, i mindst 4 uger efter, du har fået behandlingen.

Jeg har fået behandling med Breyanzi®

Vigtige kontaktoplysninger

Mit navn: _____

Navn på lægen, der forestår behandlingen med Breyanzi (skriv med blokbogstaver):

Center/hospital telefonnummer: _____

Telefonnummer uden for åbningstid: _____

Hospitalets navn: _____

Dato for infusion af Breyanzi (dd-mm-åååå):

Batchnummer (skriv med blokbogstaver): _____

Information til sundhedspersonen

Denne patient har fået et CAR-T celle produkt (Breyanzi). Breyanzi er en kimærisk antigenreceptor (CAR)-positiv T-celle-behandling, som er et cluster of differentiation (CD)19-måltrettet genetisk modificeret, autolog, cellebaseret produkt. Det består af oprenset CD8+ og CD4+ T-celler, i en defineret komposition, der er blevet separat transduceret *ex vivo* ved hjælp af en replikationsinkompetent lentiviral vector, der udtrykker en anti-CD19 CAR.

Efter behandlingen med Breyanzi kan der forekomme cytokinfrigivelses-syndrom (CRS) og/eller neurologiske toksiciteter, herunder immuneffektor-celle-associeret neurotoksicitetssyndrom (ICANS), som kan være dødelige eller livstruende. Cytokinfrigivelsessyndrom (CRS) kan involvere alle organsystemer.

Kontakt omgående den læge, der forestår behandlingen med Breyanzi, for at få mere information.

Information til patienten

Breyanzi® kan forårsage bivirkninger, der er alvorlige eller livstruende.

Ring omgående til din behandlingsansvarlige læge, eller tag direkte på skadestuen, hvis et eller flere af følgende symptomer forekommer:

Neurologiske bivirkninger

Følgende kan være symptomer på ICANS:

- Forvirring
- Nedsat opmærksomhedsniveau (nedsat bevidsthed)
- Talebesvær eller sløret tale
- Rysten (tremor)
- Angst
- Svimmelhed
- Hovedpine

Cytokinfrigørelsessyndrom (CRS)

- Feber
- Kulderystelser eller rystelser
- Træthed
- Hurtig eller ujævn hjerterytme
- Svimmelhed, ørhed eller åndenød