

PATIENTKORT

(fertile kvinder)

Dette patientkort opfylder betingelserne for markedsførings-
tilladelsen og er godkendt af Lægemiddelstyrelsen

Godkendt af Lægemiddelstyrelsen Sep 2025
2007-DK-2500002

Patientinformation

REBLOZYL (luspatercept) må ikke anvendes under graviditet og i 3 måneder inden du bliver gravid. REBLOZYL kan skade det ufødte barn.

Brug ikke REBLOZYL, hvis du er gravid eller ammer, eller hvis du kan blive gravid og ikke bruger mindst én meget sikker præventionsmetode.

Inden behandling med REBLOZYL starter:

1. Skal du have en negativ graviditetstest, som er blevet bekræftet af din ordinerende læge.
 2. Du skal tale med din læge om sikre præventionsmetoder og bruge mindst én meget sikker præventionsmetode, mens du tager REBLOZYL og i mindst 3 måneder efter at behandlingen med REBLOZYL er ophørt.
- En graviditetstest skal gentages med passende intervaller, hvilket du aftaler med din læge
 - Fortæl det straks til din læge, hvis du bliver gravid eller mener du kan være gravid. Dette gælder under behandling med REBLOZYL og i 3 måneder efter at behandlingen med REBLOZYL er ophørt.

Din ordinerende læges kontaktoplysninger står på bagsiden af dette patientkort.

Ønsker du mere information om virkninger og bivirkninger af REBLOZYL, kan du læse indlægssedlen for REBLOZYL. Den seneste version af indlægssedlen findes på www.indlaegsseddel.dk

Yderligere oplysninger eller en kopi af patientkortet fås ved henvendelse til Bristol Myers Squibb på medinfo.denmark@bms.com

Indlægssedlen er tilgængelig på www.indlaegsseddel.dk

Jeg har fået ordineret REBLOZYL

Vigtige kontaktoplysninger

Min læge, som har ordineret REBLOZYL:

Navn:

Konsultationens telefonnummer:

Konsultationens adresse: