

Munuaissyöpä

Munuaissyöpä on munuaisissa esiintyvä syöpä. Munuaissyövän tyypillisin muoto on **munuaiskarsinoma**.¹

Ilmaantuvuus¹

Suomessa munuaissyöpiä todetaan vuosittain noin 1 000 henkilöllä, joista noin 2/3 on miehiä.



Yleisimmät vaaratekijät^{1,3}

Tupakointi suurentaa munuaissyövän riskin ainakin kaksinkertaiseksi.



Korkea verenpaine



Ylipaino



Sukuhistoria

Oireet¹



Laihtuminen



Väsymys



Ajottainen kuumeilu



Verivirtsaisuus



Käsin tunnisteltavissa oleva kiinteämpi kohta



Kylkikipu

Suurin osa munuaissyövästä löytyy kuitenkin sattumalta muiden syiden vuoksi tehdyssä kaikututkimuksessa.

Diagnosointi²



Kuvantamistutkimukset ovat munuaissyövän toteamisessa keskeisiä. Tärkein tutkimus on alkuvaiheessa kaiku- eli ultraäänitutkimus. Syöpäepäilyn syntyessä potilaille tehdään thoraxin ja vatsan alueen tietokonekerroskuvaus (tietokonetomografia, TT). Myös toisen munuaisen kunto arvioidaan.

Hoitovaihtoehdot¹

Potilaan hoitovaihtoehdot riippuvat suurelta osin taudin vaiheesta ja voivat sisältää:



Leikkaushoito



Immunoterapia



Kohdennettu lääkehoito



Sädehoito

Ennuste¹



Munuaissyöpäkuolleisuus on vähentynyt. Vuoden kuluttua diagnoosista **elossa on yli 80 %** ja 5 vuoden kuluttua **lähes 70 % potilaista**.¹