


Rakkosyöpä

Suomessa todetaan vuosittain noin 1 400 uutta virtsarakon syöpää. 75 % niistä ilmenee miehillä. Rakkosyöpä on Suomessa miesten viidenneksi yleisin syöpä.¹

Mikä on rakkosyöpä?²



Noin **90%** rakkosyövistä on uroteelisyöpä. Uroteeli on välimuotoinen epiteeli (soluista koostuva kerros), joka verhoaa virtsateitä munuaisaltaista virtsaputken loppupäähän.

Uroteelisyöpä ilmaantuu yleisimmin virtsarakkoon (90–95 %) ja vain 5–10 %:ssa tauti esiintyy ylävirtsaiteissa.

Ilmaantuvuus

3x

yleisempi miehillä
kuin naisilla³



Sairastumisikä¹

Yleisimmin syöpä
ilmaantuu

75–79
-vuotiaalle



Yleisimmät vaaratekijät^{1,3}



Tupakointi



Työperäiset
altisteet



Korkea ikä

Oireet¹



Verivirtsaisuus



Kipu tai kirvely
virtsatessa




Virtsaa-
miskyvyttömyys



Tihentynyt
virtsaamistarve

Uusiutuminen³

Pinnallinen rakkosyöpä uusiutuu herkästi, ja höyläysleikkauksesta huolimatta noin



syövistä uusiutuu. Tyypillisesti pinnallinen syöpä uusiutuu pinnallisena, jolloin sen ennuste säilyy hyvänä.

Ennuste¹

Kaikista virtsarakon syöpää sairastavista viiden vuoden kuluttua diagnoosista elossa on:

miehistä



75%

naisista



70%

Hoitovaihtoehdot²

Potilaan hoitovaihtoehdot riippuvat suurelta osin taudin vaiheesta ja voivat sisältää:



Leikkaushoito



Kemoterapia



Immunoterapia



Sädehoito