

ABECMA®

IDECABTAGENE VICLEUCEL (IDE-CEL)

PATIËNTKAART

Draag deze kaart altijd bij u. Laat de kaart aan elke arts/zorgverlener zien die u ziet, ook in geval van nood.

Vertel elke arts/zorgverlener die u ziet dat u met ide-cel bent behandeld.

Tijdens de eerste 4 weken na toediening van ide-cel moet u in de buurt blijven (binnen 2 uur rijden) van het ziekenhuis waar u bent behandeld.

Ik ben behandeld met ide-cel

Belangrijke contactgegevens

Mijn naam: _____

Naam van de arts die mij heeft behandeld met ide-cel: _____

Telefoonnummer ziekenhuis: _____

Telefoonnummer ziekenhuis buiten kantooruren: _____

Naam van het ziekenhuis: _____

Datum van ide-cel -infusie (dd-mm-jjjj): _____

Batchnummer: _____

Informatie voor de zorgverlener

Deze patiënt heeft ide-cel chimere antigeenreceptor (CAR)-positieve T-celtherapie gekregen.

Na een infusie met ide-cel kan cytokinereleasesyndroom (CRS) en/of neurologische toxiciteit, inclusief immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome (ICANS) optreden, wat fataal of levensbedreigend kan zijn. Bij CRS kan elk orgaansysteem betrokken zijn.

Neem onmiddellijk contact op met de arts die de patiënt heeft behandeld met ide-cel voor meer informatie.

Zie de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van ide-cel, die u kunt vinden op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.

Informatie voor patiënten

Ide-cel kan ernstige bijwerkingen in verschillende delen van uw lichaam veroorzaken. Deze bijwerkingen kunnen levensbedreigend of zelfs fataal zijn, en moeten onmiddellijk worden behandeld.

Klachten die mild lijken kunnen snel verergeren. Klachten kunnen vertraagd optreden, soms weken tot maanden na uw behandeling met ide-cel.

Bel onmiddellijk uw behandelend arts of zoek spoedeisende hulp als een of meer van de volgende klachten optreden:

Neurologische bijwerkingen

- Verwardheid
- Geheugenproblemen
- Spraakproblemen of vertraagd spreken
- Moeite met het begrijpen van een gesprek
- Verlies van evenwicht of coördinatie
- Desoriëntatie
- Minder alert zijn (verminderd bewustzijn) of overmatige slaperigheid
- Verlies van bewustzijn
- Ijlen
- Epileptische aanvallen (stuipen)
- Rillen, zwakte met verlies van beweging aan één kant van het lichaam
- Trillen, trage bewegingen of stijfheid.

Cytokinerelasesyndroom (CRS)

- Koorts
- Rillingen
- Ademhalingsproblemen
- Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd (lage bloeddruk)
- Misselijkheid
- Hoofdpijn
- Snelle hartslag
- Vermoeidheid

Wilt u meer informatie over uw medicijn?

Lees de bijsluiter of scan de QR-code voor het online materiaal.

Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.

