

BREYANZI®

LISOCABTAGENE MARALEUCEL (LISO-CEL)

PATIËNTENKAART

Draag deze kaart altijd bij u. Laat de kaart aan elke arts/zorgverlener zien die u ziet, ook in geval van nood.

Vertel elke arts/zorgverlener die u ziet dat u met liso-cel wordt behandeld.

Tijdens de eerste 2 weken na toediening van liso-cel moet u in de buurt blijven (binnen ongeveer 2 uur rijden) van het ziekenhuis waar u bent behandeld. Mogelijk raadt uw arts u aan om langer in de buurt te blijven.

Tijdens de eerste 4 weken na de behandeling mag u geen voertuigen besturen, machines gebruiken of deelnemen aan activiteiten waarvoor u alert moet zijn. Afhankelijk van uw individuele toestand kan uw arts adviseren langer te wachten met het besturen van voertuigen.

Ik ben behandeld met liso-cel

Belangrijke contactgegevens

Mijn naam: _____

Naam van de arts die u behandelt met liso-cel: _____

Telefoonnummer ziekenhuis: _____

Telefoonnummer ziekenhuis buiten kantooruren: _____

Naam van het ziekenhuis: _____

Datum van liso-cel -infusie (dd-mm-jjjj): _____

Batchnummer: _____

Informatie voor de zorgverlener

Deze patiënt heeft liso-cel chimere antigeenreceptor (CAR)-positieve T-celtherapie gekregen.

Na een infusie met liso-cel kan cytokinereleasesyndroom (CRS) en/of neurologische toxiciteit, inclusief immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome (ICANS) optreden, wat fataal of levensbedreigend kan zijn. Bij CRS kan elk orgaansysteem betrokken zijn.

Neem onmiddellijk contact op met de arts die de patiënt behandeld met liso-cel voor meer informatie.

Zie de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van liso-cel, die u kunt vinden op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.

Informatie voor patiënten

Liso-cel kan ernstige bijwerkingen in verschillende delen van uw lichaam veroorzaken. Deze bijwerkingen kunnen levensbedreigend of zelfs fataal zijn, en moeten onmiddellijk worden behandeld.

Klachten die mild lijken, kunnen snel verergeren.

Klachten kunnen vertraagd optreden, soms weken tot maanden na uw infusie.

Bel onmiddellijk uw behandelend arts of zoek spoedeisende hulp als een of meer van de volgende klachten optreden:

Neurologische bijwerkingen

Cytokinereleasesyndroom (CRS)

De volgende klachten kunnen symptomen zijn van ICANS:

- Verwardheid
- Minder alert zijn (verminderd bewustzijn)
- Moeite met praten of slepende spraak
- Schudden (tremor)
- Angstig gevoel
- Duizeligheid
- Hoofdpijn
- Koorts
- Koude rillingen of beven
- Vermoeidheid
- Snelle of onregelmatige hartslag
- Licht gevoel in het hoofd en kortademigheid

Wilt u meer informatie over uw medicijn?

Lees de bijsluiter of scan de QR-code voor het onlinemateriaal. Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.

