

Hva du kan forvente deg av behandlingen

Før behandlingen vil behandlende lege undersøke:

- om du tar kortikosteroider eller andre behandlinger som påvirker immunsystemet
- om du tar legemidler som hindrer blodpropp (antikoagulantia)
- leverfunksjonsprøver
- tyreoidfunksjonsprøver
- om du har en autoimmun sykdom (en tilstand der kroppen angriper sine egne celler)
- om du har eller har hatt en kronisk virusinfeksjon i leveren, inkludert:
 - hepatitt B (HBV)
 - hepatitt C (HCV)
- om du har humant immunsviktvirusinfeksjon (HIV) eller ervervet immunsviktsyndrom (AIDS).
- din allmenntilstand for å avgjøre om du er egnet for behandling

Vennligst gi behandlende lege beskjed også dersom du er gravid, ammer eller planlegger å bli gravid.¹

1. YERVOY™ pakningsvedlegg.

For mer informasjon:

- Se pakningsvedlegget for YERVOY™ på felleskatalogen.no eller www.ema.europa.eu
- Kontakt Bristol-Myers Squibb medisinsk informasjon på telefon 23 12 06 37

© 2018 Bristol-Myers Squibb Company. All rights reserved. NOVEMBER 2018 731NO18NP03300.

Din guide til YERVOY™ (ipilimumab) Pasientinformasjonsbrosjyre

Denne brosjyren er utformet for å hjelpe deg til å identifisere de alvorligste bivirkningene som du kan oppleve når du blir behandlet med YERVOY™ alene. Se også pasientkortet for YERVOY™.

Hvis du har fått foreskrevet YERVOY™ i kombinasjon med OPDIVO®

➔ Se pasientkortet for OPDIVO® (nivolumab).

- YERVOY™ kan forårsake alvorlige bivirkninger i ulike deler av kroppen, og disse må behandles umiddelbart, uavhengig av alvorlighetsgrad, for å unngå forverring.
- Symptomer kan inkludere diaré, gulfarging av øyne eller hud, hudutslett med eller uten kløe, uklart syn, øyesmerte, muskelsvakhet, nummenhet eller kribling i bein, armer eller ansikt, eller hodepine.
- Før du får behandling, informer legen din om alle kjente medisinske tilstander og ethvert legemiddel du bruker eller har brukt nylig.
- Ta kontakt med legen din umiddelbart hvis du utvikler noen av symptomene som er nevnt i denne brosjyren, eller noen andre symptomer, eller hvis symptomene vedvarer eller forverres.
- Ha alltid pasientkortet med deg og vis det frem ved enhver legekonsultasjon.
- Ytterligere informasjon vedrørende YERVOY™ finnes i pakningsvedlegget.

Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon om hvordan du melder bivirkninger. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding.

Introduksjon

Denne brosjyren inkluderer et pasientkort. Ha alltid med deg pasientkortet og vis dette frem ved enhver legekonsultasjon (for eksempel hvis din behandlende lege er utilgjengelig eller du er på reise).

Pasientkortet minner deg om de viktigste symptomene som må rapporteres umiddelbart til legen/ sykepleieren. Det inneholder kontaktinformasjon til din behandlende lege og vil gjøre andre leger oppmerksomme på at du blir behandlet med YERVOY™.



Kontakt din lege på dette nummeret

Legens navn:

Telefonnummer:

Navn på sykepleier:

Telefonnummer:

De viktigste bivirkningene av behandlingen din

Det er viktig å gi behandlende lege beskjed omgående hvis du har eller utvikler noen bivirkninger, slik som de som er nevnt under.

Tidlig behandling av bivirkninger reduserer sannsynligheten for at YERVOY™-behandlingen må stoppes midlertidig eller permanent, slik at du får maksimalt utbytte av behandlingen.

Gi behandlende lege også beskjed om bivirkningene forverres, selv om de ikke virker alvorlige eller du er usikker.¹

Dersom bivirkninger oppstår, oppstår de vanligvis i løpet av de første 12 behandlingsukene. Men bivirkninger kan også være forsinket, og oppstå uker eller måneder etter den siste dosen. Dette krever oppmerksomhet for bivirkninger selv etter at du har avsluttet behandlingen.¹

MAGE OG TARM¹

- diaré (vandig, løs eller bløt avføring), blod i avføringen eller mørkere avføring
- økning i antall avføringer
- smerte eller ømhet i magen eller mageregionen, kvalme, oppkast

ØYE¹

- rødhet i øyet
- øyesmerter
- synsforandringer eller tåkesyn

LEVER¹

- gulfarging av øyne eller hud (gulsott)
- smerte på høyre side av mageregionen
- mørk urin

NERVER¹

- muskelsvakhet
- nummenhet eller kribling i bein, armer eller ansikt
- svimmelhet, tap av bevissthet eller problemer med å våkne

HUD¹

- hudutslett med eller uten kløe, tørr hud
- blemmer og/eller hudavskalling, munnsår
- hovent ansikt eller hovne lymfeknuter

GENERELLE LIDELSER¹

- feber, hodepine, tretthet
- blødning
- endret oppførsel (f.eks. redusert sexlyst, irritabilitet eller glemsomhet)

- Du skal ikke under noen omstendigheter forsøke å behandle disse symptomene selv. Du må oppsøke lege så snart som mulig.
- Ha alltid med deg pasientkortet ditt og vis dette frem ved enhver legekonsultasjon (for eksempel hvis din behandlende lege er utilgjengelig eller du er på reise).