

YERVOY® (ipilimumab)

Pasientkort

Vurdert av Legemiddelverket: november 2020
Lokalt godkjeningsnummer: 731NO2005963

 Bristol Myers Squibb™

Viktig informasjon for pasienter

Ha alltid med deg dette kortet for å informere helsepersonell om at du får behandling med YERVOY® alene.



Hvis du har noen tegn eller symptomer, gi beskjed til legen umiddelbart.

Mulige Bivirkninger



MAGE OG TARM

- diaré (vandig, løs eller bløt avføring), blod i avføringen eller mørkere avføring
- økning i antall avføringer
- smerte eller ømhet i magen eller mageregionen, kvalme, oppkast



LEVER

- gulfarging av øyne eller hud (gulsott)
- smerter på høyre side av mageregionen
- mørk urin



HUD

- hudutslett med eller uten kløe, tørr hud
- blemmer og/eller hudavskalling, munnsår
- hovent ansikt eller hovne lymfeknuter



ØYE

- rødhet i øyet
- øyesmerter
- synsforandringer eller tåkesyn



NERVER

- muskelsvakhet
- nummenhet eller kribling i bein, armer eller ansikt
- svimmelhet, tap av bevissthet eller problemer med å våkne



GENERELLE

- feber, hodepine, tretthet
- blødninger
- endret oppførsel (f.eks. redusert sexlyst, irritabilitet eller glemsomhet)
- dehydrering, lavt blodtrykk, sjokk

VIKTIG

- Fortell legen din om alle tidligere sykdommer.
- Tidlig behandling av bivirkninger reduserer sannsynligheten for at behandlingen med YERVOY® må stoppes midlertidig eller permanent.
- Milde tegn og symptomer kan raskt forverres hvis de ikke behandles.
- IKKE forsøk å behandle disse symptomene på egenhånd.
- Tegn og symptomer kan være forsinket og kan oppstå uker eller måneder etter din siste YERVOY® injeksjon.

For ytterligere informasjon, se pakningsvedlegget for YERVOY® på www.felleskatalogen.no.

Kontaktinformasjon til min lege (som har forskrevet YERVOY®)

Legens navn:

.....

Telefonnummer i arbeidstiden:

.....

Telefonnummer utenfor arbeidstiden:

.....

Min kontaktinformasjon

Mitt navn og telefonnummer:

.....

Navn og telefonnummer på omsorgsperson (i nødstilfelle):

.....

VIKTIG informasjon til helsepersonell

- Denne pasienten er under behandling med YERVOY® monoterapi.
- Immunrelaterte bivirkninger kan oppstå under behandling eller måneder etter avsluttet behandling.
- Tidlig diagnose og hensiktsmessig håndtering er avgjørende for å minimere livstruende komplikasjoner.
- Konsultasjon med en onkolog eller en annen spesialist kan være til hjelp ved organ-spesifikke immunrelaterte bivirkninger.
- Helsepersonell, se godkjent preparatomtale (SPC) for YERVOY® på www.felleskatalogen.no eller www.legemiddelsok.no eller kontakt Medisinsk informasjon på 23 12 06 37 for ytterligere informasjon.



Helsepersonell som behandler denne pasienten med YERVOY® skal fylle ut «Kontaktinformasjon til min lege» i dette pasientkortet.