

Pasientkort

Dette pasientkortet er en del av markedsføringstillatelsen for Opdualag.

Informasjon til pasienter

Ha alltid med deg dette kortet, og vis frem til alt av helsepersonell (f.eks. lege, sykepleier, farmasøyt, legevaktpersonell) for å informere dem om at du behandles med Opdualag.



VIKTIG

Opdualag kan forårsake alvorlige immunrelaterte bivirkninger som kan ramme ulike deler av kroppen. Disse bivirkningene kan forekomme når som helst, kan være forsinket, og kan utvikle seg uker eller måneder etter din siste dose. Noen av følgende bivirkninger kan være livstruende og trenger behandling umiddelbart:

Del av kroppen	Mulig bivirkning
 Lungene	Ny eller forverret hoste, kortpustethet, pustevansker eller brystmerter.
 Mage og tarm	Diaré (vandig, løs eller bløt avføring) eller mer hyppig avføring enn vanlig; avføring som er svart, tjæreaktig, klissete eller har blod eller slim; eller smerter eller ømhet i magen eller mageregionen.
 Lever	Gulfarging av huden eller øyne (gulsott), oppkast eller kvalme, smerter på høyre side i mageregionen, mørk urin, tretthet, blødning eller får blåmerker lettere enn vanlig.
 Hormon-produserende kjertler (inkludert diabetes og diabetisk ketoacidose)	Hodepine, økt svetting, vektøkning eller vekt-nedgang, økt tretthet, være mer sulten eller tørst enn vanlig, behov for å tisse oftere, håravfall, frysninger, forstoppelse, endringer i stemmen, svimmelhet eller besvimelse, endringer i humør eller atferd, lysfølsomhet, øyeproblemer, raske hjerteslag, ha problemer med å tenke klart, søtlig lukt fra pusten, søt eller metallisk smak i munnen eller unormal lukt fra urinen eller svetten, føle seg syk eller være syk, magesmerter og dyp eller rask pust.
 Nyrer	Redusert mengde urin, hevelse i anklene, redusert appetitt eller blod i urinen.
 Huden	Utslett, kløe, hudavskalling; smertefulle sår eller munnsår.
 Hjerte	Nye eller forverrede brystmerter, uregelmessige og/eller raske hjerteslag, utmattelse (fatigue), hevelse i anklene eller kortpustethet.
 Generelt/andre	Forvirring, søvnighet, problemer med hukommelsen, stivhet i nakke, balanseproblemer, kribling eller nummenhet i armer og ben, dobbeltsyn, øyesmerter, synsforandringer, vedvarende eller alvorlig muskelsmerte eller svakhet, muskelkramper eller hovne lymfekjertler.



Hvis du opplever noen tegn eller symptomer som er nevnt i dette kortet, eller hvis symptomene vedvarer eller forverres, fortell legen eller sykepleieren din eller søk annen medisinsk hjelp **umiddelbart**.

Immunrelaterte bivirkninger kan også forekomme i andre organer og vev. Dette pasientkortet beskriver ikke alle tegn og symptomer på problemer knyttet til Opdualag-behandling. Kontakt lege, sykepleier eller apotek dersom du opplever bivirkninger, også de som ikke er oppført på dette kortet eller i pakningsvedlegget.



MER INFORMASJON

- Fortell legen din om tidligere eller nåværende medisinske tilstander eller tidligere/nåværende behandlinger. Dette inkluderer om du har hatt eller planlegger en stamcelletransplantasjon med stamceller fra donor (allogen) eller har hatt en organtransplantasjon.
- Tidlig identifisering og behandling av bivirkninger er viktig for å bidra til sikker bruk av Opdualag. Tegn og symptomer som kan virke milde kan raskt forverres hvis de ikke behandles.
- **IKKE FORSØK** å behandle noen symptomer på egenhånd. Det er svært viktig at du tar kontakt med legen din eller sykepleieren for å få råd.
- Hvis du har bivirkninger, kan det hende du trenger andre legemidler for å redusere symptomene dine eller forhindre at de forverres. Legen din kan også trenge å utsette eller stoppe behandlingen med Opdualag hvis du utvikler alvorlige bivirkninger.
- Dersom du ønsker mer informasjon, les pakningsvedlegget for Opdualag på www.felleskatalogen.no. Eller vennligst kontakt Bristol Myers Squibb Medisinsk Informasjon på 23 12 06 37 eller medinfo.norway@bms.com.



VIKTIG informasjon til helsepersonell

- Denne pasienten er under behandling med Opdualag, som kan forårsake alvorlige immunrelaterte bivirkninger (irAR) som kan påvirke ulike organsystemer og være livstruende.
- Immunrelaterte bivirkninger kan forekomme når som helst, kan være forsinket, og kan utvikle seg uker eller måneder etter siste dose.
- Tidlig diagnose og hensiktsmessig behandling av immunrelaterte bivirkninger er avgjørende for å minimere livstruende komplikasjoner.
- Konsultasjon med en onkolog eller annen medisinsk spesialist kan være til hjelp ved organ-spesifikk immunrelatert bivirkning.
- Helsepersonell, se godkjent preparatomtale for Opdualag på www.felleskatalogen.no eller kontakt Bristol Myers Squibb Medisinsk Informasjon på 23 12 06 37 eller medinfo.norway@bms.com for ytterligere informasjon.

Kontaktinformasjon til min lege (som forskrev Opdualag) Fyll ut med STORE BOKSTAVER.

Legensnavn: _____

Telefonnummeriarbeidstiden: _____

Telefonnummerutenforarbeidstiden: _____

Min kontaktinformasjon

Mittnavn: _____

Mitttelefonnummer: _____

Ved nødstilfelle, vennligst kontakt:

Navn: _____

Telefonnummer: _____