



REBLOZYL® (Iuspatercept) Karta dla Pacjenta

REBLOZYL® (Iuspatercept)

Karta dla Pacjenta

(dla kobiet mogących zajść w ciążę)

Informacja dla Pacjenta

REBLOZYL (luspatercept) nie może być stosowany u kobiet w ciąży i przez 3 miesiące przed zajściem w ciążę. REBLOZYL może powodować wady u nienarodzonego dziecka.

Produktu leczniczego REBLOZYL nie należy stosować w trakcie ciąży i karmienia piersią oraz u kobiet, które mogą zajść w ciążę i nie stosują, co najmniej jednej skutecznej metody antykoncepcji.

• Przed rozpoczęciem stosowania leku REBLOZYL:

1. Lekarz zweryfikuje czy test ciążowy jest negatywny.
 2. Lekarz poinformuje o konieczności stosowania, co najmniej jednej skutecznej metody antykoncepcji w trakcie leczenia lekiem Reblozyl i przez 3 miesiące po zaprzestaniu leczenia tym lekiem.
- Testy ciążowe muszą być wykonywane w odpowiednich odstępach czasu.
 - W przypadku stwierdzenia ciąży lub podejrzenia ciąży w trakcie stosowania leku REBLOZYL lub w okresie 3 miesięcy od zaprzestania stosowania leku REBLOZYL należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza prowadzącego.

Na końcu karty znajdują się dane kontaktowe do lekarza prowadzącego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Wszelkie przypadki podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego związanego ze stosowaniem produktu leczniczego REBLOZYL prosimy zgłaszać do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, korzystając z następujących danych kontaktowych:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa,
tel: +48 22 49 21 301,
faks: +48 22 49 21 309
strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Jakiegokolwiek podejrzenie wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego REBLOZYL można również zgłaszać telefonicznie pod numer +48 22 260 6404 lub drogą elektroniczną na adres: informacja.medyczna@bms.com

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących mechanizmu działania i działań niepożądanych należy zapoznać się z Ulotką dla Pacjenta produktu leczniczego REBLOZYL.

Pacjentowi został przepisany lek REBLOZYL

Ważne informacje kontaktowe

Lekarz, który przepisał lek REBLOZYL:

Nazwisko:	
Numer telefonu w miejscu pracy:	
Adres ośrodka:	