

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare.

Bra att veta om din intravenösa infusions- behandling med ORENCIA[®] (abatacept)



 ORENCIA[®]
(abatacept)

Innehållsförteckning

Om ORENCIA®	3
Din behandling	7
Användbara delar	11
Ordlista	18

Om ORENCIA®

Vad är ORENCIA® och vad används det för?

ORENCIA® används för att behandla måttlig till svår aktiv ledgångsreumatism (även kallat reumatoid artrit eller RA) då du inte svarat tillräckligt bra på behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel eller med en annan läkemedelsgrupp som kallas ”tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare”. ORENCIA® används i kombination med ett läkemedel som heter metotrexat. ORENCIA® kan också användas med metotrexat för att behandla högaktiv och progressiv reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat. ORENCIA® tillhör en typ av läkemedel som kallas selektiva co-stimulationsmodulatorer. Den aktiva substansen i ORENCIA®, abatacept, är ett protein som tas fram med hjälp av cellodlingar.

Din läkare har ordinerat ORENCIA® för att minska dina tecken och symtom på RA och för att minska de ledsador som orsakas av sjukdomen.

Vad du kan förvänta dig av behandlingen med ORENCIA®

Ledgångsreumatism är vanligen en kronisk, långsiktig och progressiv sjukdom. Målet med ORENCIA®-behandlingen är att bromsa den skada på lederna som kan orsakas av ledgångsreumatism och att förbättra den fysiska funktionen. Genom att sjukdomsförloppet bromsas kan även ledskadorna förhindras och smärta och trötthet lindras. Därmed kan din livskvalitet förbättras. Du kanske inte omedelbart märker några effekter av ORENCIA® då det kan ta flera veckor innan läkemedlet når sin fulla effekt. Det är viktigt att du fortsätter att ta läkemedlet även om du inte märker någon förbättring under de första veckorna. Din läkare kommer att följa upp och utvärdera hur effektivt ORENCIA® är för dig.

Så fungerar ORENCIA®

Hos personer med ledgångsreumatism attackerar kroppens eget immunsystem normala kroppsvävnader. Det kan leda till smärta och svullnad i lederna, och kan orsaka ledskador. ORENCIA® minskar immunsystemets angrepp på normal vävnad genom att påverka de immunceller (T-celler) som är inblandade i sjukdomen ledgångsreumatism.



Din behandeling

Behandlingsplan

Ordination: Din läkare har ordinerat ORENCIA® till dig.

Infusion: ORENCIA® ges till dig som en intravenös (IV) infusion. Det betyder att du får ORENCIA® genom en infart som placeras i en ven i din arm. Infusionen varar omkring 30 minuter. En sjuksköterska ger dig medicinen. Efter den första infusionen ges ORENCIA® vecka 2 och 4, därefter ges ORENCIA® 1 gång per månad. Efter infusionen behöver du i regel inte stanna kvar för observation, detta förutsatt att inte sjukvårdspersonalen ber dig om det förstås.

Ditt åtagande: Var noga med att notera dina kommande besökstider. Det är mycket viktigt att du får ORENCIA® i enlighet med det som ordinerats av din läkare.

Kommunikation: Berätta för din läkare och annan sjukvårdspersonal hur du mår både före och efter infusionen. Du och din läkare kommer tillsammans fram till dina personliga behandlingsmål, vilka kan innebära minskad smärta, bibehållande av funktioner för vardagliga aktiviteter, förbättrad hälsorelaterad livskvalitet och bromsad sjukdomsprogress. Genom att vara aktiv och prata med din läkare kan ni tillsammans bidra till att dessa mål uppnås.

Hur vet jag om ORENCIA® fungerar?

Du kanske inte märker några effekter av ORENCIA® med en gång eftersom det kan ta flera veckor innan läkemedlet når sin fulla effekt. Din läkare kommer att övervaka dina symtom och kan komma att ta blodprover för att mäta hur effektivt ORENCIA® fungerar på dig.

Vilka eventuella biverkningar kan jag få av ORENCIA®?

ORENCIA® kan orsaka biverkningar, men det är inte alla som får dem. De vanligaste biverkningarna med ORENCIA® är huvudvärk, illamående och infektioner i övre luftvägarna (inklusive näs- och halsinfektioner). I likhet med alla läkemedel som påverkar immunsystemet kan ORENCIA® orsaka allvarliga biverkningar som kan kräva behandling. Tala omedelbart om för din läkare om du märker något av det följande:

- ▶ svåra utslag, nässelfeber eller andra tecken på en allergisk reaktion
- ▶ svullnad i ansikte, händer eller fötter
- ▶ svårigheter att andas eller svälja
- ▶ feber, viktnedgång, apati, allmän sjukdomskänsla, tandbesvär, sveda vid vattenkastning, smärtsamma hudutslag, smärtsamma hudblåsor eller hosta.

För fullständig lista över biverkningar, se bipacksedeln som följer med förpackningen med ORENCIA®.

Allergiska reaktioner: Om du får allergiska symtom såsom tryck över bröstet, väsande andning, allvarlig yrsel eller ostadighet, svullnader eller hudutslag ska du omedelbart tala med din läkare.

Infektioner: Om du har någon form av infektion, inklusive långvarig eller lokal infektion, eller om du ofta får infektioner, ska du vara försiktig när du tar ORENCIA®. Det är viktigt att du berättar för din läkare om du har infektionssymtom (t.ex. feber, sjukdomskänsla [allmänt obehag], tandbesvär). ORENCIA® kan även försämra din kroppsförmåga att bekämpa infektioner och behandlingen kan göra dig mer benägen att få infektioner eller förvärra befintliga infektioner.

Kan jag ta ORENCIA® om jag är gravid eller ammar?

Effekterna av ORENCIA® vid graviditet är inte kända, använd därför inte ORENCIA® om du är gravid om inte din läkare särskilt rekommenderar det. Om du är kvinna och kan bli gravid, måste du använda säkra preventivmedel medan du använder ORENCIA® och upp till 14 veckor efter sista dosen. Din läkare kommer att ge dig råd om lämpliga preventivmetoder. Om du blir gravid medan du använder ORENCIA®, tala om detta för din läkare. Om du har fått ORENCIA® under graviditeten, kan ditt barn ha en högre risk för att få en infektion. Innan ditt barn får något vaccin är det viktigt att du talar med ditt barns läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal om din användning av ORENCIA® under graviditeten. Det är inte känt om ORENCIA® utsöndras i modersmjölk. Du måste avbryta amningen om du behandlas med ORENCIA® och inte amma fram till 14 veckor efter sista dosen av ORENCIA®.

Bör jag äta någon särskild kost eller motionera medan jag tar ORENCIA®?

Det finns ingen specifik kost som du behöver följa medan du tar ORENCIA®. Tala med din läkare om hälsosam kosthållning och motion.

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har infektionssymptom så som t.ex. feber, sjukdomskänsla eller tandbesvär.

Användbara delar

Mina kontaktuppgifter

Min läkares namn:	
Läkarens telefon:	
Min sjuksköterskas namn:	
Sjuksköterskans telefon:	
Klinik:	
Sjukhus:	
Sjukhusets telefon:	
Övriga anteckningar:	

Be din läkare eller sjuksköterska om tiderna för dina kommande besök

Besök	Datum	Tid	Kommentarer
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Var noga med att notera dina kommande besökstider. Det är mycket viktigt att du får ORENCIA® i enlighet med det som ordinerats av din läkare. Om du missar ett besök för ORENCIA®-infusion, kontakta genast din läkare för att boka ny tid för din nästa dos.



Ordlista

Abatacept – detta är det generiska namnet på ORENCIA® (ORENCIA® är varumärket).

Intravenös (IV) injektion eller infusion – en injektion eller infusion som ges i en ven. ORENCIA® kan ges intravenöst eller via subkutan injektion, beroende på vad din läkare har förskrivit till dig

Metotrexat (MTX) – ett läkemedel som används för att behandla ledgångsreumatism. ORENCIA® används i kombination med (tas tillsammans med) metotrexat.

ORENCIA® – även kallat abatacept, ORENCIA® är ett läkemedel som ordineras i kombination med metotrexat för behandling av ledgångsreumatism.

Progressiv – RA som fortskrider (framåtskridande)

Reumatoid artrit (RA) – en kronisk, potentiellt allvarlig, långvarig sjukdom vid vilken lederna inflammeras vilket orsakar smärta, svullnad och stelhet. Kallas ofta också för ledgångsreumatism.

Subkutan (SC) injektion – en injektion som ges under huden.

Följande organisation tillhandahåller
rådgivning och stöd till personer som
lever med ledgångsreumatism och
deras närstående:

Reumatikerförbundet
(www.reumatikerforbundet.org)

ORENCIA® finns som injektionsvätska för subkutan injektion och som pulver till koncentrat till infusionsvätska för intravenös infusion. Den verksamma substansen i ORENCIA® heter abatacept.

Vad ORENCIA är och vad det används för: Subkutan och intravenös beredningsform:

Reumatoid artrit - ORENCIA® används hos vuxna för att behandla måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) då du inte svarat tillräckligt bra på behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel eller med en annan läkemedelsgrupp som kallas "tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare". ORENCIA® används i kombination med ett läkemedel som heter metotrexat. ORENCIA® kan också användas med metotrexat för att behandla högaktiv och progressiv reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat.

ORENCIA® används för att bromsa ledskadan och förbättra din fysiska förmåga.

Psoriasisartrit - ORENCIA® används hos vuxna för att behandla aktiv psoriasisartrit ensamt eller i kombination med metotrexat. Om du har aktiv psoriasisartrit får du först andra läkemedel. Om du inte svarar tillräckligt bra på dessa läkemedel kan du få ORENCIA för att minska tecken och symtom på din sjukdom, bromsa ben- och ledskadan och förbättra din fysiska förmåga.

Endast intravenös beredningsform:

Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit - ORENCIA® används hos barn och ungdomar i åldrarna 6 till 17 år för att behandla polyartikulär juvenil idiopatisk artrit då du inte svarat tillräckligt bra på behandling med TNF-hämmare. ORENCIA® används för att förbättra tecken och symtom på polyartikulär juvenil idiopatisk. ORENCIA® används i kombination tillsammans med metotrexat för att behandla din polyartikulära juvenila idiopatiska artrit. ORENCIA® har inte studerats hos barn under 6 år.

Använd inte ORENCIA® om du är allergisk mot abatacept eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. Påbörja inte behandling med ORENCIA® om du har en allvarlig eller okontrollerad infektion. En infektion gör att du riskerar att få allvarliga biverkningar av ORENCIA®.

Ytterligare information: För fullständig information om ORENCIA®, läs noga igenom bipacksedeln som medföljer förpackningen (och den finns även på www.fass.se).

Bristol-Myers Squibb AB



www.bms.se | www.orenciapatient.se

Tel: 08-704 71 00