

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare.

Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA® (abatacept) för reumatoid artrit (RA)



Innehållsförteckning

Om ORENCIA	3
Din behandling	7
Användbara delar	11
Ordlista	15

För fullständig information, läs noga bipacksedeln som finns både på fass.se och i förpackningen med ORENCIA.

Om ORENCIA



Vad är ORENCIA och vad används det för?

ORENCIA används för att behandla måttlig till svår aktiv ledgångsreumatism (även kallat reumatoid artrit eller RA) hos vuxna som inte svarat tillräckligt bra på behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel eller med en annan läkemedelsgrupp som kallas "tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare". ORENCIA används i kombination med ett läkemedel som heter metotrexat. ORENCIA kan också användas med metotrexat för att behandla högaktiv och progressiv reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat. ORENCIA tillhör en typ av läkemedel som kallas selektiva co-stimulationsmodulatorer. Den aktiva substansen i ORENCIA, abatacept, är ett protein som tas fram med hjälp av cellodlingar.

Din läkare har ordinerat ORENCIA för att minska dina tecken och symtom på RA och för att minska de ledsador som orsakas av sjukdomen.

Vad du kan förvänta dig av behandlingen med ORENCIA

Ledgångsreumatism är vanligen en kronisk, långsiktig och progressiv sjukdom. Målet med ORENCIA-behandlingen är att bromsa den skada på lederna som kan orsakas av ledgångsreumatism och att förbättra den fysiska funktionen. Genom att sjukdomsförloppet bromsas kan även leddskadorna förhindras och smärta och trötthet lindras. Därmed kan din livskvalitet förbättras. Du kanske inte omedelbart märker några effekter av ORENCIA då det kan ta flera veckor innan läkemedlet når sin fulla effekt. Det är viktigt att du fortsätter att ta läkemedlet även om du inte märker någon förbättring under de första veckorna. Din läkare kommer att följa upp och utvärdera hur effektivt ORENCIA är för dig.

Så fungerar ORENCIA

Hos personer med ledgångsreumatism attackerar kroppens eget immunsystem normala kroppsvävnader. Det kan leda till smärta och svullnad i lederna, och kan orsaka leddskador. ORENCIA minskar immunsystemets angrepp på normal vävnad genom att påverka de immunceller (T-celler) som är inblandade i sjukdomen ledgångsreumatism.



Din behandeling



Behandlingsplan

Ordination: Din läkare har ordinerat ORENCIA till dig.

Infusion: ORENCIA ges till dig som en intravenös (IV) infusion. Det betyder att du får ORENCIA genom en infart som placeras i en ven i din arm. Infusionen varar omkring 30 minuter. En sjuksköterska ger dig medicinen. Efter den första infusionen ges ORENCIA vecka 2 och 4, därefter ges ORENCIA 1 gång per månad. Efter infusionen behöver du i regel inte stanna kvar för observation, detta förutsatt att inte sjukvårdspersonalen ber dig om det förstås.

Ditt åtagande: Var noga med att notera dina kommande besökstider. Det är mycket viktigt att du får ORENCIA i enlighet med det som ordinerats av din läkare.

Kommunikation: Berätta för din läkare och annan sjukvårdspersonal hur du mår både före och efter infusionen. Du och din läkare kommer tillsammans fram till dina personliga behandlingsmål, vilka kan innebära minskad smärta, bibehållande av funktioner för vardagliga aktiviteter, förbättrad hälsorelaterad livskvalitet och bromsad sjukdomsprogress. Genom att vara aktiv och prata med din läkare kan ni tillsammans bidra till att dessa mål uppnås.

Hur vet jag om ORENCIA fungerar?

Du kanske inte märker några effekter av ORENCIA med en gång eftersom det kan ta flera veckor innan läkemedlet når sin fulla effekt. Din läkare kommer att övervaka dina symtom och kan komma att ta blodprover för att mäta hur effektivt ORENCIA fungerar på dig.

Vilka eventuella biverkningar kan jag få av ORENCIA?

ORENCIA kan orsaka biverkningar, men det är inte alla som får dem. De vanligaste biverkningarna med ORENCIA är huvudvärk, illamående och infektioner i övre luftvägarna (inklusive näs- och halsinfektioner). I likhet med alla läkemedel som påverkar immunsystemet kan ORENCIA orsaka allvarliga biverkningar som kan kräva behandling. Tala omedelbart om för din läkare om du märker något av det följande:

- ▶ svåra utslag, nässelfeber eller andra tecken på en allergisk reaktion
- ▶ svullnad i ansikte, händer eller fötter
- ▶ svårigheter att andas eller svälja
- ▶ feber, viktninskning, apati, allmän sjukdomskänsla, tandbesvär, sveda vid vattenkastning, smärtsamma hudutslag, smärtsamma hudblåsor eller hosta.

För fullständig lista över biverkningar, läs noga bipacksedeln som finns både på fass.se och i förpackningen med ORENCIA.

Allergiska reaktioner: Om du får allergiska symtom såsom tryck över bröstet, väsande andning, allvarlig yrsel eller ostadighet, svullnader eller hudutslag ska du omedelbart tala med din läkare.

Infektioner: Om du har någon form av infektion, inklusive långvarig eller lokal infektion, eller om du ofta får infektioner, ska du vara försiktig när du tar ORENCIA. Det är viktigt att du berättar för din läkare om du har infektionssymtom (t.ex. feber, sjukdomskänsla [allmänt obehag], tandbesvär). ORENCIA kan även försämra din kroppsförmåga att bekämpa infektioner och behandlingen kan göra dig mer benägen att få infektioner eller förvärra befintliga infektioner.

Neurologiska symtom: Om du, din partner eller din vårdgivare märker debuterande eller förvärrade neurologiska symtom, däribland allmän muskelsvaghet, synstörningar, svårighet att prata, förändrat sätt att gå eller problem med balans, förändringar i tankar, minne eller orientering som leder till förvirring och personlighetsförändringar ska du omedelbart kontakta din läkare då detta kan vara symtom på en väldigt sällsynt, allvarlig och potentiellt dödlig hjärninfektion som kallas progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).

Kan jag ta ORENCIA om jag är gravid eller ammar?

Effekterna av ORENCIA vid graviditet är inte kända, använd därför inte ORENCIA om du är gravid om inte din läkare särskilt rekommenderar det. Om du är kvinna och kan bli gravid, måste du använda säkra preventivmedel medan du använder ORENCIA och upp till 14 veckor efter sista dosen. Din läkare kommer att ge dig råd om lämpliga preventivmetoder. Om du blir gravid medan du använder ORENCIA, tala om detta för din läkare. Om du har fått ORENCIA under graviditeten, kan ditt barn ha en högre risk för att få en infektion. Innan ditt barn får något vaccin är det viktigt att du talar med ditt barns läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal om din användning av ORENCIA under graviditeten. Det är inte känt om ORENCIA utsöndras i modersmjölk. Du måste avbryta amningen om du behandlas med ORENCIA och inte amma fram till 14 veckor efter sista dosen av ORENCIA.

Bör jag äta någon särskild kost eller motionera medan jag tar ORENCIA?

Det finns ingen specifik kost som du behöver följa medan du tar ORENCIA. Tala med din läkare om hälsosam kosthållning och motion.

Tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har infektionssymptom så som t.ex. feber, sjukdomskänsla eller tandbesvär.

Användbara delar



Mina kontaktuppgifter

Min läkares namn:	
Läkares telefon:	
Min sjuksköterskas namn:	
Sjuksköterskans telefon:	
Klinik:	
Sjukhus:	
Sjukhusets telefon:	
Övriga anteckningar:	

Be din läkare eller sjuksköterska om tiderna för dina kommande besök

Besök	Datum	Tid	Kommentarer
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Var noga med att notera dina kommande besökstider. Det är mycket viktigt att du får ORENCIA i enlighet med det som ordinerats av din läkare. Om du missar ett besök för ORENCIA-infusion, kontakta genast din läkare för att boka ny tid för din nästa dos.

Anteckningar

Ordlista

Abatacept – detta är det generiska namnet på ORENCIA (ORENCIA är varumärket).

Intravenös (IV) injektion eller infusion – en injektion eller infusion som ges i en ven.

Metotrexat (MTX) – ett läkemedel som används för att behandla ledgångsreumatism. ORENCIA används i kombination med (tas tillsammans med) metotrexat.

ORENCIA – även kallat abatacept, ORENCIA är ett läkemedel som ordineras i kombination med metotrexat för behandling av ledgångsreumatism.

Progressiv – RA som fortskrider (framåtskridande)

Reumatoid artrit (RA) – en kronisk, potentiellt allvarlig, långvarig sjukdom vid vilken lederna inflammeras vilket orsakar smärta, svullnad och stelhet. Kallas ofta också för ledgångsreumatism.

Subkutan (SC) injektion – en injektion som ges under huden.



Följande organisation tillhandahåller rådgivning och stöd till personer
som lever med ledgångsreumatism och deras närstående:

Reumatikerförbundet
(reumatiker.se)

För fullständig information, läs noga bipacksedeln som finns
både på fass.se och i förpackningen med ORENCIA.



www.bms.com/se | www.orenciapatient.se

Tel: 08-704 71 00