

益伏® YERVOY® 病患用藥指導

益伏® YERVOY® (ipilimumab) 會在身體許多部位引起可能致命之嚴重副作用，必須立即由主治醫師處理；如有以下任何症狀，立即聯絡主治醫師

看似輕微之症狀，如不治療可能快速惡化；症狀可能會延遲出現，最後一次輸注後幾週至幾個月才發生；您無需擔心是否會打擾主治醫師，請放心與醫師聯絡。

腸胃

- 腹瀉（稀便）或排便次數增加
- 糞便中有血，或是黑便、瀝青便、黏稠便
- 胃痛（肚子痛）或觸痛

眼部

- 視力模糊、複視或其他視力問題
- 眼睛疼痛或發紅

皮膚

- 有或沒有發癢的皮疹
- 嘴破
- 水泡及／或脫皮

全身

- 頭痛
- 感覺疲累
- 噁心或嘔吐
- 暈眩或頭昏
- 皮膚或眼白發黃
- 尿液顏色變深
- 比平常容易出血或瘀青
- 腿部、手部或臉部無力
- 手腳麻木或刺痛
- 行為改變，例如性衝動減少、焦躁或健忘
- 發燒

重要

患者提醒事項

- 未經主治醫師允許，請勿使用任何成藥、飲食補充品或處方藥物治療上述症狀
- 急診或前往其他醫療院所就醫時，請攜帶本指導

- 就醫時務必告知醫師您正在接受益伏® YERVOY® (ipilimumab) 治療並**出示本指導**。

益伏® YERVOY® 可能會在身體許多部位引起嚴重副作用；這些副作用通常發生在治療期間，但有時會在最後一次輸注後幾個月才發生。這些副作用可能需要特殊治療。

如果您出現任何本指導上症狀請立即通知主治醫師。看似輕微之症狀，如不治療可能引起嚴重甚至危及生命之情況。請對所有照顧您的醫療人員出示本指導，告訴他們您正在接受益伏® YERVOY® 治療。

請閱讀益伏® YERVOY® 病患用藥指導，如果想了解更多資訊或有任何疑問請與醫師討論。

如果想了解更多資訊，請致電 0800-666-132

我的主治醫師聯絡資訊

主治醫師姓名：

辦公室電話：

非上班時間聯絡電話：

我的姓名與電話：