



重要事項

- 請告訴醫師您過去的任何醫療狀況，包括是否曾使用捐贈者幹細胞（異體）進行幹細胞移植等。
- 及早治療副作用可減少 YERVOY® 治療需要暫時或永久停藥的情況。
- 如果未及時治療，輕度的徵兆和症狀可能快速惡化。
- 請勿試圖自己治療這些症狀。
- 副作用徵兆和症狀可能延遲發生，也可能在最後一劑 YERVOY® 注射之後數週到數個月才發生。

醫師聯絡資訊 (YERVOY® 處方醫師)

醫師姓名：

診間電話：

下班時間聯絡電話：

我的聯絡資訊

姓名：

電話：

照護者姓名及電話 (緊急情況時)：

益伏® YERVOY® (Ipilimumab)

病人警示卡

台灣食品藥物管理署核准日期：

2021 年 7 月

台灣必治妥施貴實股份有限公司核准編號：

731-TW-2100007

台灣小野藥品工業股份有限公司核准編號：

NV-080421-OT-01

給病人的重要資訊

請隨身攜帶這張卡片，告知專業醫療人員
您目前正在接受 YERVOY® 單一藥物治療。

 如果您出現任何徵兆或症狀，請立刻告訴醫師。

可能的副作用



胃腸道

- 腹瀉 (水便、稀便或軟便)、糞便帶血或顏色變深
- 頻繁排便，次數比平常多
- 胃或腹部疼痛或觸痛、噁心、嘔吐



肝臟

- 眼睛或皮膚發黃 (黃疸)
- 右腹部疼痛
- 尿液顏色變深



皮膚

- 皮疹，伴隨或未伴隨搔癢；皮膚乾燥
- 水疱及/或皮膚脫皮、口腔潰瘍
- 臉部或淋巴腺腫脹



眼睛

- 眼睛發紅
- 眼睛疼痛
- 視力問題或視力模糊



神經

- 肌肉無力
- 腿部、手臂或臉部發麻或刺痛感
- 頭暈、失去意識或清醒困難



全身

- 發燒、頭痛、疲倦
- 出血
- 行為改變 (例如性慾減低、易怒或健忘)
- 脫水、血壓過低、休克

給專業醫療人員的重要資訊

- 此病人正在接受 YERVOY® 單一療法。
- 免疫相關不良反應 (irAR) 可能在治療期間的任何時間或停藥後數個月內發生。
- 早期診斷和適當處置免疫相關不良反應(irAR)，對於減緩有危及生命的併發症極其重要。
- 處置特定器官的免疫相關不良反應 (irAR)，可以諮詢腫瘤專科醫師或其他專科醫師。
- 專業醫療人員可參見 [益伏® YERVOY® 核准仿單] 或致電醫療諮詢 0800-666-132 以取得更多資訊。

處方 YERVOY® 的專業醫療人員
可以在醫師聯絡資訊處
留下您的聯絡方式。

