

可心歐 CAMZYOS<sup>®</sup>▼ (mavacamten)

# 病人用藥指引

衛生福利部食品藥物管理署核准日期：22-Aug-2025

台灣必治妥施貴寶核准編號：3500-TW-2500007

 Bristol Myers Squibb<sup>®</sup>

▼ CAMZYOS 應接受額外監測，以利迅速發現新的安全性資訊。  
您可以透過通報您發生的任何副作用來協助監測工作。



## 簡介

您收到這本病人用藥指引，是因為醫師為您開立了 CAMZYOS。CAMZYOS 是一種心臟處方藥，適用於治療成人症狀性阻塞型肥厚性心肌病變 ( 簡稱 HCM )。



此病人用藥指引中隨附一張病人警示卡，請隨時隨身攜帶這張病人警示卡。請向所有照護您的醫療專業人員說明您正在使用 CAMZYOS。病人警示卡包含 CAMZYOS 主要風險資訊及處方醫師的詳細聯絡資訊。


請詳閱食品藥物管理署核准的藥品的包裝說明書，瞭解 CAMZYOS 的詳細資訊。如果您有進一步的問題，請詢問處方醫師、醫師或藥師。



可心歐膠囊 2.5 毫克



可心歐膠囊 5 毫克



可心歐膠囊 10 毫克



可心歐膠囊 15 毫克

## 什麼是症狀性阻塞型肥厚性心肌病變？

肥厚性心肌病變 ( 簡稱 HCM ) 會導致心肌壁增厚變硬，造成心臟充血困難。有些 HCM 病人的心肌變得非常厚，導致心臟泵送到身體其他部位的血流受阻或減少。

## ❓ CAMZYOS 如何作用？

CAMZYOS 的作用是減少心臟過度收縮和體內血流阻塞，因此可能改善您的症狀和運動能力。

### 劑量說明

- 進行細胞色素 P450 2C19 ( CYP2C19 ) 基因型檢測，以選擇適當的 CAMZYOS 劑量。如果在開始治療前尚未確定 CYP2C19 表現型，給藥劑量建議比照代謝不良表現型，直至確定 CYP2C19 表現型。
- 對於 CYP2C19 代謝能力不良表現型者，建議起始劑量為每日口服一次，每次 2.5 毫克；對於 CYP2C19 中等、正常、快速與超快速代謝表現型之病人，建議起始劑量為每日口服一次，每次 5 毫克。

### 什麼是心臟超音波，有什麼重要性？

常規型心臟超音波檢查 ( 簡稱超音波 ) 可協助醫師評估 CAMZYOS 對您的心臟造成的影響。心臟超音波是使用音波產生心臟的影像，透過這項檢查，醫師可以瞭解您的心臟對治療的反應，確保您使用最佳劑量。根據超音波檢查結果，醫師可能增加、減少或維持您的 CAMZYOS 劑量，或暫停 / 停止治療。在開始 CAMZYOS 之前，將進行首次超音波檢查。後續的超音波檢查時間點為第一劑 CAMZYOS 之後 4 週、8 週和 12 週，及後續每 12 週一次。

如果 CAMZYOS 劑量改變，或您使用的其他藥物劑量改變，也需依照醫師指示進行超音波檢查。也就是在您變更劑量之後 4 週，將進行一次超音波追蹤檢查，然後第 8 週再進行一次。之後，您會恢復每 12 週一次的常規超音波檢查時程。



請務必依照處方醫師的指示，預約及接受超音波檢查。在手機或日曆上設定提醒，有助於記得超音波的日期和時間。



## 重要安全性資訊

CAMZYOS 治療有三個主要風險：

- 收縮功能障礙導致心臟衰竭，也就是心臟無法將足夠的血液泵送到全身
- 與某些藥物和草藥補充劑交互作用，導致心臟衰竭
- 胚胎-胎兒毒性 ( 對未出生嬰兒的毒性 )

與 CAMZYOS 相關的其他可能副作用請參閱食品藥物管理署核准的包裝說明書。

### CAMZYOS 與心臟衰竭

收縮功能障礙導致心臟衰竭是一個嚴重的情況，有時甚至可能致命。

如果您出現新的心臟衰竭症狀或原有症狀惡化，包括呼吸急促、胸痛、倦怠、心跳加速 ( 心悸 )、腿部腫脹，請**立即**告訴處方醫師或醫師或是就醫。

在 CAMZYOS 治療前和治療期間，請告訴您的處方醫師或醫師任何新發生或既有的醫療狀況。某些病症，例如感染或心房顫動 ( 心跳不規律且快速 )，可能影響您的 CAMZYOS 治療。

### CAMZYOS 與藥物交互作用

有些藥物 ( 包括非處方藥 ) 和有些草藥補充劑可能影響您體內 CAMZYOS 的濃度，提高收縮功能障礙導致心臟衰竭的風險。告訴處方醫師、醫師或藥師，您使用的所有處方藥、非處方藥和草藥補充劑，即使不是每天使用也要告知。在尚未告訴處方醫師、醫師或藥師之前，**請勿**開始使用或停用任何藥物或草藥補充劑，或改變其劑量。

**表 1** 舉例說明可能影響體內 CAMZYOS 濃度的藥物和產品。請注意，這些舉例僅為指引，而非此類別所有可能藥物之完整列表。不建議間歇性使用可能影響體內 CAMZYOS 濃度的產品，包括處方藥和非處方藥、維生素、草藥補充劑和葡萄柚汁。

表 1：可能影響 CAMZYOS 的藥物和產品舉例

藥物 / 產品	治療的病症
Omeprazole、esomeprazole	胃潰瘍、胃酸逆流
Clarithromycin、rifampicin	細菌感染
Verapamil、diltiazem	心臟病症
Fluconazole、itraconazole、ketoconazole、posaconazole、voriconazole	真菌感染
Fluoxetine、fluvoxamine	憂鬱
Ritonavir、cobicistat	人類免疫缺乏病毒 (HIV)
Telaprevir	C 型肝炎
葡萄柚汁	

請注意，這些範例僅供參考，並非所有可能屬於此類別的藥品之完整清單。完整清單請參閱台灣食品藥物管理署核准的藥品說明書，並與您的處方醫師、藥師及 / 或醫療團隊成員討論。

### CAMZYOS 與胚胎-胎兒毒性 (對未出生嬰兒的毒性)

如果您已懷孕，或是有生育能力但未使用高度有效的避孕方法，絕對不可使用 CAMZYOS，以免對未出生的嬰兒造成傷害。

如果您有生育能力，在開始使用 CAMZYOS 之前需要確認驗孕結果為陰性。在治療期間至最後一劑 CAMZYOS 後至少 4 個月內，您必須使用高度有效的避孕方法。請與醫師討論什麼避孕方法最適合您。

如果您計畫懷孕請告訴醫師。在 CAMZYOS 治療期間，如果您疑似懷孕或已經懷孕了，請立即告訴處方醫師或醫師。處方醫師或醫師會與您討論您的治療選擇。



## 什麼時候需要就醫？

使用 CAMZYOS 期間，如果您出現任何副作用（即使未列在此病人用藥指引中），請告訴照護您的醫療專業人員。食品藥物管理署核准的包裝說明書也列出可能的副作用。如您懷疑有副作用，您可透過全國藥物不良反應通報系統 (<https://adr.fda.gov.tw/logon>) 向食品藥物管理署通報。向食品藥物管理署通報副作用有助於蒐集本藥品的其他安全性資訊。

如果您出現新的心臟衰竭症狀或原有症狀惡化，包括呼吸急促、胸痛、倦怠、心跳加速（心悸）、腿部腫脹，請**立即**告訴處方醫師或醫師或是就醫。



## 其他資訊

如果您對 CAMZYOS 有任何問題或疑慮，請與處方醫師、醫師、藥師或醫療團隊成員討論。


詳細資訊請聯絡：必治妥施貴寶醫療資訊聯絡中心。

電話：0800-666-132

電子郵件：MedInfo.Taiwan@bms.com



©2025 MyoKardia, Inc. · 必治妥施貴寶旗下公司  
CAMZYOS® 為 MyoKardia, Inc. 商標。  
衛生福利部食品藥物管理署核准日期：22-Aug-2025  
台灣必治妥施貴寶核准編號：3500-TW-2500007



病人用藥指引及  
病人警示卡電子檔