



ORENCIA® Waarschuwingskaart voor de patiënt

NL

Deze waarschuwingskaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u voor en tijdens behandeling met ORENCIA op de hoogte dient te zijn.

- Laat deze kaart aan uw behandelend arts(en) zien.

Infecties

Door gebruik van ORENCIA stijgt het risico op infecties.

- U mag niet behandeld worden met ORENCIA als u een ernstige infectie heeft.
- U dient voorafgaand aan de behandeling met ORENCIA onderzocht te worden op bepaalde infecties.

Tuberculose (tbc): u dient voor behandeling met ORENCIA onderzocht te worden op tbc. Het is erg belangrijk dat u uw arts vertelt of u ooit tbc heeft gehad of wanneer u nauw contact heeft gehad met iemand die tbc heeft gehad.

Hepatitis: antireumatische behandeling is in verband gebracht met hepatitis B reactivatie. U dient onderzocht te worden op virale hepatitis volgens gepubliceerde richtlijnen.

Infecties

- Als u symptomen ontwikkelt die wijzen op een infectie, bijvoorbeeld koorts, aanhoudende hoest, gewichtsverlies of lusteloosheid, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw behandelend arts.

Allergische Reacties

Allergische reacties kunnen optreden na het gebruik van ORENCIA. Als u symptomen zoals benauwdheid, piepende ademhaling, ernstige duizeligheid of een licht gevoel in uw hoofd ervaart, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Datum ORENCIA behandeling:

Start: _____ Meest recent: _____

- Lees de bijsluiter van ORENCIA voor meer informatie.
- Neem een lijst mee van al uw geneesmiddelen iedere keer dat u een arts, verpleegkundige of apotheker bezoekt.

Naam patiënt: _____ Naam arts: _____

Telefoonnr. arts: _____

Draag deze kaart bij u tot 3 maanden na de laatste ORENCIA dosering, omdat bijwerkingen een lange tijd na de laatste dosering kunnen optreden.

ORENCIA dient niet te worden gebruikt bij zwangere vrouwen behalve als er een duidelijke noodzaak is. Als u ORENCIA heeft gekregen terwijl u zwanger was, is het belangrijk dat u de zorgverleners van de baby hierover informeert voordat uw baby wordt ingeënt. Uw baby kan mogelijk een risico lopen op ernstige infecties die veroorzaakt worden door "levende vaccins" gedurende de 14 weken na de laatste aan u toegediende dosis ORENCIA.

Sep 2020