

Patiëntenbrochure over ipilimumab

Informatie voor de patiënt

Let op bij gebruik van ipilimumab. Ipilimumab is het werkzaam bestanddeel in het medicijn. Uw medicijn kan ook een andere (merk)naam dragen. Kijk dus goed over welk medicijn dit gaat.

Als **alleen ipilimumab** aan u is voorgeschreven:

▶ Lees deze gids en de ipilimumab Waarschuwingskaart voor de patiënt.

Als **ipilimumab in combinatie met nivolumab** aan u is voorgeschreven:

▶ Lees dan de nivolumab Waarschuwingskaart voor de patiënt.

- Ipilimumab kan ernstige bijwerkingen veroorzaken in verschillende delen van het lichaam die, ongeacht de ernst, onmiddellijk behandeld moeten worden om te voorkomen dat deze verergeren.
- Symptomen kunnen o.a. zijn: diarree, geel worden van ogen of huid, huiduitslag met of zonder jeuk, wazig zien, oogpijn, spierzwakte, gevoelloosheid of tintelingen in benen, armen of gezicht of hoofdpijn.
- Informeer uw arts over al uw medische aandoeningen en alle medicijnen die u gebruikt, of recent heeft gebruikt, voordat u uw behandeling ontvangt.
- Bel uw arts onmiddellijk als u een van de symptomen krijgt die in deze brochure staan beschreven, of als u andere symptomen krijgt, of als de symptomen aanhouden of erger worden.
- Draag de Waarschuwingskaart voor patiënten altijd bij u en laat deze zien aan iedere zorgverlener die u bezoekt.
- Meer informatie over ipilimumab kunt u vinden in de bijsluiter op www.cbg-meb.nl.

Inleiding

Deze gids geeft u informatie over de behandeling met ipilimumab. Er staan klachten en bijwerkingen in die u zou kunnen krijgen.

In deze gids staan ook belangrijke adviezen. Over wat u moet doen als u klachten of bijwerkingen krijgt. Zo kunt u helpen om ervoor te zorgen dat de klachten en bijwerkingen niet erger worden. En dat u zo snel en zo goed mogelijk wordt behandeld als u bijwerkingen krijgt.

Ipilimumab kan ernstige bijwerkingen geven op verschillende plekken in het lichaam. Alle bijwerkingen, of ze nu ernstig zijn of niet, moeten meteen worden behandeld zodat ze niet erger worden.

In deze gids zit een **Waarschuwingskaart voor de patiënt**. Denk eraan om deze kaart altijd bij u te hebben. U moet deze laten zien aan alle dokters, apothekers en verpleegkundigen waarmee u te maken krijgt (bijvoorbeeld wanneer uw eigen dokter er niet bij is).

Wat moet u met uw arts bespreken voordat uw behandeling met ipilimumab kan starten?



U moet uw dokter vertellen over alle ziektes die u heeft en die u heeft gehad. Ook moet u uw dokter vertellen over alle medische behandelingen die u ooit heeft gekregen en die u nu krijgt.

Uw dokter zal het volgende nagaan, voordat uw behandeling met ipilimumab kan beginnen:

- of u corticosteroiden gebruikt. Of andere geneesmiddelen die zich richten op het immuunsysteem
- of u geneesmiddelen gebruikt die zorgen dat uw bloed minder snel stolt (antistollingsmiddelen, anticoagulantia)
- of uw lever goed werkt
- of uw schildklier goed werkt
- of u een auto-immuunziekte heeft (een aandoening waarbij het lichaam de eigen cellen aanvalt)
- of u een langdurige virusinfectie van de lever heeft, of deze ooit heeft gehad, waaronder:
 - o hepatitis B (HBV)
 - o hepatitis C (HCV)
- of u hiv (infectie met humaan immunodeficiëntievirus) heeft of AIDS (acquired immunodeficiency syndrome)
- of u zwanger bent, borstvoeding geeft of van plan bent zwanger te worden
- uw algemene lichamelijke conditie om te bepalen of u behandeld kunt worden

De belangrijkste mogelijke bijwerkingen van uw behandeling

Ipilimumab helpt uw eigen immuunsysteem om kankercellen te bestrijden. Hierdoor ontstaat er een risico dat uw immuunsysteem ook gezonde cellen in uw lichaam aanvalt. Dat kan soms leiden tot ernstige of levensbedreigende bijwerkingen. Klachten en tekenen van bijwerkingen kunnen op ieder moment ontstaan. Tijdens de behandeling, maar ook pas maanden nadat uw behandeling klaar is.

Wat moet u doen als u denkt dat u een bijwerking heeft?



- Bel **meteen** met uw dokter als u klachten of bijwerkingen heeft. Bel ook als u klachten of bijwerkingen heeft die niet overgaan, of erger worden. Als bijwerkingen die mild lijken niet behandeld worden, kunnen ze snel erger worden.
- Probeer **niet** zelf iets aan de bijwerkingen te doen.
- De volgende lijst met klachten en tekenen geeft een overzicht van mogelijke bijwerkingen van ipilimumab. De lijst is niet volledig. Er kunnen ook andere bijwerkingen optreden.

Vroeg behandelen van bijwerkingen verkleint de kans dat de behandeling met ipilimumab tijdelijk of helemaal moet worden gestopt.

Mogelijke bijwerkingen



MAAG EN DARMEN

- diarree (waterige, dunne of zachte poep), bloed in uw poep of donkere poep
- u moet vaker naar de wc dan normaal
- pijn of een gevoelige maag of buik, misselijkheid, overgeven



LEVER

- geel oogwit of gele huid ('geelzucht')
- pijn aan de rechterbovenkant van uw buik
- donkergekleurde plas



HUID

- huiduitslag met of zonder jeuk, droge huid
- blaren en/of schilferende huid, pijnlijke zweertjes in de mond
- zwelling in het gezicht of van de lymfeklieren



OGEN

- rode ogen
- pijnlijke ogen
- wazig zien of andere problemen met zien



ZENUWSTELSEL

- zwakke spieren
- geen gevoel of een tintelend gevoel in uw benen, armen of gezicht
- duizeligheid, flauwvallen of moeilijk wakker worden



ALGEMEEN

- koorts, hoofdpijn, vermoeidheid
- bloedingen
- veranderingen in uw gedrag, (bijvoorbeeld minder zin in seks, snel geïrriteerd zijn of vergeetachtig zijn)
- uitgedroogd zijn, lage bloeddruk

Andere belangrijke bijwerkingen

Ernstige toedieningsreacties

- Er kunnen reacties ontstaan door de toediening van ipilimumab in het bloed. Als dit gebeurt, is dat meestal binnen 24 uur na toediening van ipilimumab.
- **Vertel het meteen aan uw dokter of verpleegkundige als u de volgende klachten krijgt tijdens een toediening van ipilimumab:**
 - o koude rillingen, of trillen
 - o jeuk of huiduitslag
 - o plotseling warm en rood worden
 - o moeilijk kunnen ademen
 - o duizeligheid
 - o koorts
 - o het gevoel dat u flauw gaat vallen

De Waarschuwingskaart voor de patiënt

- Houd de kaart altijd bij u. U moet deze laten zien aan dokters, apothekers en verpleegkundigen. Zij weten dan dat u ipilimumab krijgt.
- De Waarschuwingskaart helpt u om te onthouden welke klachten u meteen moet melden bij uw dokter of verpleegkundige. Op de kaart staan ook de naam en het telefoonnummer van uw dokter. De kaart zorgt ervoor dat alle zorgverleners weten dat u ipilimumab krijgt.
- De dokter die u ipilimumab geeft, moet zijn of haar naam en telefoonnummer invullen op de Waarschuwingskaart en ook op de pagina hieronder.

plak hier de
waarschuwingskaart
NL

plak hier de
waarschuwingskaart
EN

Gegevens van uw dokter (die u behandelt met ipilimumab):

Naam van de dokter:

Telefoonnummer tijdens werktijden:

Telefoonnummer buiten werktijden:

Naam verpleegkundige:

Telefoonnummer tijdens werktijden:

Telefoonnummer buiten werktijden:

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

Waar kunt u meer informatie vinden?

Een interactieve versie van de informatie in deze brochure is te raadplegen op <http://pwa.ltd/yervoy-pat-NL> en via:



Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn.

Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).