

DOSKORT

**ORENCIA<sup>®</sup>** (abatacept)

**Förfylld penna (ClickJect<sup>®</sup>)**  
**125 mg**

Injektionsvätska, lösning



**Förfylld spruta**  
**125 mg**

Injektionsvätska, lösning



**Intravenös infusion**  
**250 mg**

Pulver till koncentrat till  
infusionsvätska, lösning



**Bristol-Myers Squibb**

[www.bms.com/se](http://www.bms.com/se)

 **ORENCIA<sup>®</sup>**  
(abatacept)

# ORENCIA® (abatacept)

## 125 mg

Injektionsvätska, lösning  
Förfylld penna (ClickJect®)



## Dosering vuxna Reumatoid artrit och Psoriasisartrit


### NY PATIENT PÅ ORENCIA® SC FÖRFYLLED PENNA

- Ges varje vecka som en subkutan injektion (SC)
- 125 mg oberoende av vikt
- Eventuell intravenös bolusdos:  
Reumatoid artrit: kan inledas med eller utan bolusdos  
Psoriasisartrit: ej behov av bolusdos
- Om behandlingen inleds med en intravenös infusion ska den första subkutana injektionen ges inom ett dygn efter avslutad infusion. Därefter ges de subkutana injektionerna en gång per vecka



### BYTE FRÅN ORENCIA® IV TILL ORENCIA® SC FÖRFYLLED PENNA

- Patienter som övergår från intravenös behandling (IV) med ORENCIA® till subkutan administrering ska ta den första subkutana dosen istället för nästa planerade intravenösa dos



# ORENCIA® (abatacept)

## 125 mg

Injektionsvätska, lösning  
Förfylld spruta



## Dosering vuxna

### Reumatoid artrit och Psoriasisartrit

(för pJIA se [www.fass.se](http://www.fass.se))


#### NY PATIENT PÅ ORENCIA® SC FÖRFYLLED SPRUTA

- Ges varje vecka som en subkutan injektion (SC)
- 125 mg oberoende av vikt
- Eventuell intravenös bolusdos  
Reumatoid artrit: kan inledas med eller utan bolusdos  
Psoriasisartrit: ej behov av bolusdos
- Om behandlingen inleds med en intravenös infusion ska den första subkutana injektionen ges inom ett dygn efter avslutad infusion. Därefter ges de subkutana injektionerna en gång per vecka



#### BYTE FRÅN ORENCIA® IV TILL ORENCIA® SC FÖRFYLLED SPRUTA

- Patienter som övergår från intravenös behandling (IV) med ORENCIA® till subkutan administrering ska ta den första subkutana dosen istället för nästa planerade intravenösa dos



# ORENCIA® (abatacept)

## 250 mg

Pulver till koncentrat till  
infusionsvätska, lösning



## Dosering vuxna

### Reumatoid artrit och Psoriasisartrit (för pJIA se [www.fass.se](http://www.fass.se))


- Ges som en intravenös infusion under 30 minuter
- Ingen premedicinering krävs
- Ingen extra observationstid efter infusionen, utöver klinikens vanliga rutiner
- Byte från TNF-hämmare kan ske utan wash-out period<sup>1</sup>

Kroppsvikt (kg)	Dos (mg)*	Antal injektionsflaskor**
<60	500	2
60-100	750	3
>100	1000	4

\* Cirka 10 mg/kg

\*\* Varje injektionsflaska innehåller 250 mg abatacept för administrering

- Efter den inledande infusionen ska ORENCIA® ges efter 2 veckor och efter 4 veckor, och därefter var fjärde vecka



Referens:

1. Schiff M et. al Ann Rheum Dis 2009;68:1708-1714

[www.bms.com/se](http://www.bms.com/se)

[www.orenciapatient.se](http://www.orenciapatient.se)

FEB 2020 4275E2000624-01