

CÁNCER CABEZA Y CUELLO



ESTIMACIÓN DE NUEVOS CASOS EN ESPAÑA EN 2021¹:

>11.000
CASOS



MUERTES EN ESPAÑA (ENERO-MAYO 2020)¹: 1.545

♂ 1.211
♀ 334

La probabilidad de padecer cáncer se incrementa de forma muy notable a partir de los 45 años.¹⁻³

Gráfico a partir de: Las cifras del cáncer en España 2021- SEOM 2021; Mody MD, et al. 2021 y Johnson DE, et al. 2020


FACTORES DE RIESGO^{2,3}



El tabaco es el principal factor de riesgo del CCECC, cuyas tasas siguen aumentando en los países en desarrollo²



El consumo excesivo de alcohol es otro factor de riesgo independiente de CCECC, que además potencia el efecto del tabaco²



La infección persistente por VPH son factores de riesgo de CCECC. El sexo oral es el principal factor de riesgo implicado en la infección por VPH^{2,3}

Otros factores de riesgo...

- Susceptibilidad genética
- Reflujo laringo-faríngeo
- Masticación de nueces de areca/betel
- Dietas ricas en grasas animales y pobres en frutas y verduras
- Exposición a la contaminación atmosférica u otros compuestos carcinogénicos

- Disfagia
- Ronquera
- Pérdida de peso
- Odinofagia
- Irregularidades de la mucosa o ulceraciones
- Presencia de masa inexplicable en el cuello
- Otalgia
- Dolor oral u orofaríngeo

DIAGNÓSTICO

EXPLORACIÓN INICIAL

Exploración completa de la cabeza, el cuello y la cavidad oral. Evaluación endoscópica de nasofaringe, orofaringe y laringe.


EXPLORACIONES ADICIONALES

Toma de imágenes transversales de la cabeza y el cuello. Rx de tórax.

ESTADIAJE TRAS EL DIAGNÓSTICO

- TAC/PET-TAC
- RM
- TC con contraste

LOCALIZACIÓN



- a Senos paranasales
- b Cavidad nasal
- c Cavidad oral
- d Glándulas salivales
- e Lengua
- f Laringe
- g Nasofaringe
- h Orofaringe
- i Hipofaringe
- j Faringe

Los grandes consumidores de tabaco y alcohol tienen un riesgo >35 veces de desarrollar CCECC³

SÍNTOMAS